Italian Teachers' Programme
CERN
13–18 Novembre 2022

Introduzione alla fisica delle particelle 1

Michelangelo L. Mangano
CERN, Theoretical Physics Department

Responsabile dell' LHC Physics Centre at CERN
http://cern.ch/lpcc

michelangelo.mangano@cern.ch

La fisica delle particelle ha radici molto lontane!

Essa eredita il compito di rispondere a domande che hanno guidato lo sviluppo del pensiero filosofico nel corso dei millenni

- Come funziona l'Universo?
- Da dove viene?
- Dove va?

- Quali sono i componenti ultimi della materia?
- Come "si muovono"?
- Che cosa "li muove"?

Anche il modo di affrontare il problema usato dai filosofi antichi è simile a quello del fisico moderno:

identificare pochi principi fondamentali, dai quali derivare le proprietà di tutti i fenomeni naturali, sia quelli pertinenti al macro cosmo (il cielo, l'universo), che quelli pertinenti alla scala umana

Ciò che è cambiato nel corso dei secoli è la percezione della vera complessità dei fenomeni, la capacità di eseguire misure quantitative, ed i criteri epistemologici di adeguatezza della loro descrizione

In comune, l'identificazione di due categorie:

(a) I componenti della materia

(b) Le forze che governano i loro comportamenti

Esempio dal passato remoto

Componenti:
aria, acqua fuoco, terra

Forze:
- aria e fuoco spinti verso l'alto
- terra ed acqua spinti verso il basso

Valutazione di correttezza:
come mai un tronco di legno immerso a fondo nell'acqua viene a galla, spinto verso l'alto?

Rivalutazione della teoria (Principio di Archimede):
- tutta la materia viene spinta verso il basso, ma con intensità proporzionale al proprio peso:

Un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta verso l'alto pari al peso dell'acqua spostata.

Questa teoria e' piu' semplice, e migliore della precedente, perche' d'un tratto spiega anche nuovi fenomeni, per es. il vento: l'aria calda e' piu'leggera della fredda, e' spinta verso l'alto, e la fredda si muove dentro, creando il vento

Il primo esempio di "unificazione delle forze" ?

Si noti che non esiste garanzia a priori che la natura possa essere descritta da un numero limitato di principi, o che questi valgano ovunque e sempre.

Per es., la conservazione dell'energia su scala microscopica e' stata messa in dubbio dai primi studi quantitativi dei decadimenti beta nucleari, negli anni 20..

Il grande successo della fisica moderna e' nella sua descrizione, incredibilmente accurata, della totale moltitudine dei fenomeni naturali osservati



materia ordinaria non luminosa (pianeti, stelle morte, polvere, asteroidi, buchi neri, …), ~4%

materia luminosa (stelle, gas) ~0.5%

Esempio: unificazione delle leggi alle scale umane e cosmiche

I.Newton

$$F = -G_N \frac{M\,m}{R^2}$$



Esempio: unificazione delle leggi alle scale cosmiche e microscopiche

E. Rutherford





$$F = -G_N \frac{M\,m}{R^2}$$

I.Newton

$$F = -\alpha \frac{Q\,q}{R^2}$$

C-A de Coulomb

.... and from atomic to subnuclear ....



From: Contemporary Physics Education Project, http://www.cpepphysics.org/

Livello 0: cosa? come?

- Esistono componenti elementari irriducibili della materia?
- Se sì, cosa sono?
  - come interagiscono?
  - come determinano le proprietà dell'Universo?

Di cosa sono fatti elettroni, protoni, neutroni?

- **Gli elettroni "sono" elementari**
- **Protoni e neutroni sono composti da 3 "quarks"**



- **I quarks "sono" elementari**

NB "sono" significa: "per quanto ne sappiamo oggi, sono"


MATTER
ATOM
NUCLEUS
electron
neutron
PROTON
QUARK
ALL ORDINARY MATTER BELONGS TO THIS GROUP.
LEPTONS
QUARKS
electron
Electric charge –1.
Responsible for electricity and chemical reactions
electron neutrino
Electric charge 0.
Rarely interacts with other matter.
up
Electric charge + 2/3.
Protons have 2 up quarks
Neutrons have 1 up quark
down
Electric charge –1/3.
... and one down quark.
... and two down quarks.
THESE PARTICLES EXISTED JUST AFTER THE BIG BANG.
NOW THEY ARE FOUND ONLY IN COSMIC RAYS AND ACCELERATORS.
muon
A heavier relative of the electron.
muon neutrino
Created with muons when some particles decay.
charm
A heavier relative of the up.
strange
A heavier relative of the down.
tau
Heavier still.
tau neutrino
Not yet observed directly.
top
Heavier still, recently observed.
bottom
Heavier still.
ANTIMATTER
Each particle also has an antimatter counterpart ... sort of a mirror image.

Interazioni (o "forze")

- Responsabili di:
  - Formazione di **stati legati** (E<0):
    - Terra-sole
    - Elettrone-nucleo
  - Processi di **collisione/diffusione** (E>0):
    - Moto di elettroni in un metallo
    - Propagazione della luce
    - Deflessione di particelle cariche in moto in un campo elettromagnetico per es. i protoni nell' LHC
  - **Transmutazioni**:
    - transizioni atomiche (emissione di radiazione quanto un elettrone cambia orbita)
    - Decadimenti (n->p e neutrino, radioattivita')

BOSONS

force carriers
spin = 0, 1, 2, ...

Unified Electroweak spin = 1

Name	Mass GeV/c^2	Electric charge
γ photon	0	0
W^-	80.39	–1
W^+ W bosons	80.39	+1
Z^0 Z boson	91.188	0

Strong (color) spin =1

Name	Mass GeV/c^2	Electric charge
g gluon	0	0

EW symmetry breaking spin=0

H higgs	**125**	**0**

Properties of the Interactions

The strengths of the interactions (forces) are shown relative to the strength of the electromagnetic force for two u quarks separated by the specified distances.

Property	Gravitational Interaction	Weak Interaction (Electroweak)	Electromagnetic Interaction	Strong Interaction
Acts on:	Mass – Energy	Flavor	Electric Charge	Color Charge
Particles experiencing:	All	Quarks, Leptons	Electrically Charged	Quarks, Gluons
Particles mediating:	Graviton (not yet observed)	W^+ W^- Z^0	γ	Gluons
Strength at 10^{-18} m	10^{-41}	0.8	1	25
Strength at 3×10^{-17} m	10^{-41}	10^{-4}	1	60

Principali risultati concettuali

- ***Semplicita'*** (dei componenti fondamentali, e delle loro interazioni): la complessita' emerge dalla gran varieta' di combinazioni di aggregati di oggetti elementari (come il gioco dei LEGO!)
- ***Unita'*** (delle leggi di interazione)
- ***Unita'*** (degli elementi):

  "un protone e' un protone e' un protone"

- ***Unicita'*** (delle leggi fondamentali): independenti da posizione, tempo e condizioni esterne

I principi fondamentali della fisica, e le particelle elementari

Le particelle elementari sono soggette agli stessi principi fondamentali della fisica che si imparano a scuola:

- "F=ma" => varie leggi della dinamica…
- causalità (la causa precede l'effetto)
- conservazione dell'energia (E), momento (p) e momento angolare (L) (invarianza delle leggi fisiche rispetto a rotazioni e traslazioni di tempo e spazio)
- Principio di relatività speciale di Einstein
- Meccanica quantistica (dualità onda-particella, principio di indeterminazione, quantizzazione dei livelli energetici, …)

Il ruolo della relatività speciale

- Le particelle elementari hanno masse piccolissime, e le forze tipiche presenti negli acceleratori e nell'universo le accelerano a velocità vicine a quella della luce.
- **Gli effetti relativisitici sono essenziali**, e la descrizione del loro comportamento deve essere consistente con le leggi della Relatività Speciale (Einstein)
- In particolare, ogni modello delle interazioni fra particelle elementari deve rispettare il principio che le forze non possono essere trasmesse istantaneamente, ma al piú alla velocità della luce

La rappresentazione delle interazioni



Feynman diagram

N.B.: in meccanica quantistica onde e particelle sono rappresentazioni diverse ma equivalenti dello stesso oggetto. Dunque all'onda che trasmette il segnale dell'interazione associamo una particella

Semplice! ma sottile...



prima:

dopo: +

Energia(prima) ≠ Energia(dopo)

Cosa succede alla conservazione dell'energia?

Count fast!







Meccanica quantistica

Principio di indeterminazione di Heisenberg:

una misura di energia eseguita entro un tempo **Δt** puo' al piu' raggiungere una precisione **ΔE ≥ 1/Δt**





Δt < 1/ΔE

Entro questo intervallo e' impossibile determinare se l'energia e' conservata o meno, poiche' non possiamo misurarla con sufficiente accuratezza! Dunque e' possibile "barare" con la natura, e permettere lo scambio di energia fra le due particelle, effettuandolo entro **Δt**

Interazioni dei leptoni (ℓ=e,μ,τ)



∝ -e=electric charge





∝ g_W=weak charge





Interazioni dei quarks

$\propto 2/3\ e$



$\propto -1/3\ e$



$\propto g_W$



$\propto g_S$

Esempio

Protone



$$Q = 2/3\ e + 2/3\ e - 1/3\ e = e$$

Neutrone



$$Q = 2/3\ e - 1/3\ e - 1/3\ e = 0$$

Esempio, i "pioni"

$\pi^+ = u\bar{d}$ $\pi^- = \bar{u}d$





$Q = 2/3\ e + (-)(-1/3)\ e = e$

$Q = -2/3\ e + (-1/3)\ e = -e$

dove $\bar{q}$ e' l'**antiquark** del quark **q**

$\pi^0 = d\bar{d} + u\bar{u}$



$Q = 0$

Esempio, i "kaoni"

$K^+ = u\bar{s}$



$Q = 2/3\ e + (-)(-1/3)\ e = e$

$K^- = \bar{u}s$



$Q = -2/3\ e + (-1/3)\ e = -e$

$\bar{K}^0 = d\,\bar{s}$



$Q = -1/3\ e + (-)(-1/3)\ e = 0$

$K^0 = \bar{d}s$



$Q = (-)(-1/3)\ e\ + (-1/3\ e) = 0$

Esempio: la radioattivita'

$N_Z \rightarrow N_{Z+1}$ e ν



Trasformazioni come questa, in cui protoni e neutroni si trasformano gli uni negli altri con emissione di elettroni e neutrini, sono alla base del funzionamento delle stelle

Esse generano l'energia prodotta dalle stelle, ne trasformano il contenuto, fino all'esaurimento del loro potenziale energetico. Per le stelle piu' grandi, alla fine della loro vita, l'energia gravitazionale induce un collasso finale, ed ad un ultimo ciclo di trasformazioni nucleari, da cui emergono, in una catastrofica esplosione, nuclei piu' pesanti come silicio, ferro, oro, uranio, che, disperdendosi nello spazio, ed unendosi a nubi di gas in procinto di formare nuove stelle e sistemi solari, danno origine a stelle come il sole, e pianeti come la terra.

Esempio: decadimento dei kaoni

$K^o \rightarrow \pi^+ e \nu$



Esempio: decadimento dei kaoni

$K^o \rightarrow \pi^+ \pi^-$



Observables and fundamental quantities

- ***Mass***:
  - Composite particles -> dynamical origin, calculable: $M=E/c^2$, $E=T+U$
  - Fundamental particles -> assigned parameter; origin ???
  - Measurement:
    - in decays: $P=\sum p_i$, $M^2=P^2$
    - in production: M=minimum energy necessary for creation
- ***Charge***:
  - Which type (electric,weak, strong)?
  - Are there other charges?? What is the origin of charge??
  - Measurement: interaction strength
    - lifetime of a particle before its decay
    - reaction probabilities (rate counting)
- ***Spin*** (intrinsic angular momentum):
  - Integer-> bosons, Semi-integer -> fermions
  - Origin??
  - Pauli principle (two identical fermions cannot occupy the same quantum state) at the origin of matter stability and diversity
  - Measurement: angular distributions in scattering or decay processes

Examples of mass determination:

M= energy at production threshold

Production rate for $e^+e^- \rightarrow$ hadrons, as a function of the center of mass energy





The peaks represent the appearance of a new possible final state, made it possible by having enough CM energy to create it. It appears as a "resonance" in a "spectrum".



Decays and lifetimes

- If the couplings of a particle **A** allow it to transform itself into a series of particles $\mathbf{B}_1$, ..., $\mathbf{B}_{n'}$ and if $m_A > m_{B1} + ... + m_{Bn'}$ **A** decays into $\mathbf{B}_1+...+\mathbf{B}_n$.

  Only particles for which no decay channel is open can be stable. As of today, we only know of three such examples: the electron, the lightest neutrino and the proton (although there are theories in which the proton is predicted to decay with a lifetime of about 10^{34} years, as well as theories in which stable heavy particles explain the origin of dark matter).

- Example:



- The stronger the couplings, and the larger the mass difference, the faster the decay:

$$N(t) = N(0)\, e^{-t/\tau}$$

where $\tau=\tau(M,g)$ is the **life time**

Example: counting the number of neutrinos



$\tau \propto 1/(\text{number of holes}) \sim 1/(\text{number of decay channels})$

$\tau(Z) = 1 / \Gamma(Z) \propto 1/$number of decay channels

$$\Gamma(Z) = \sum_{q \setminus m_q < m_Z/2} \Gamma(Z \to q\bar{q}) + \sum_{\ell \setminus m_\ell < m_Z/2} \Gamma(Z \to \ell^+\ell^-) + \sum_{\nu \setminus m_\nu < m_Z/2} \Gamma(Z \to \nu\bar{\nu})$$



$$N_{events}(e^+e^- \rightarrow Z^0) \propto [(S - M_Z^2)^2 + M_Z^2 \Gamma_Z^2]^{-1}$$

$\sqrt{S}$=Energy(e^+e^-)



LEP $e^+e^- \rightarrow Z^0$ data, showing that the number of neutrino species N_ν=3

The measurement of a width can tell us something about what is not directly seen! It's like knowing that there is a leak in your tank if your car runs out of petrol while sitting in the parking lot!

More in general, the measurement of a width will give us the strength of the coupling of the decaying particle to the decay products. The width (lifetime) itself is therefore not an "intrinsic" property of a particle, but is a consequence of its mass and of its interactions with other particles.

The goals of the LHC

- To firmly establish the **"what"**:
  - discover the crucial missing element of the Standard Model, namely the **Higgs boson => done !**
  - search for possible new fundamental interactions, too weak to have been observed so far
  - search for possible new generations of quarks or leptons
  - confirm/disprove the elementary nature of quarks/leptons
  - discover direct evidence for the particle responsible for the **Dark Matter** in the Universe
- To firmly establish the **"how"**: the observation of the Higgs boson, and the determination of its properties, will complete the dynamical picture of the Standard Model, confirming (hopefully!) our presumed understanding of "how" particles acquire a mass.
- To seek new elements which can help us shed light on the most difficult question, namely **WHY?**

Esplorare la struttura del protone

Se l'energia con cui sondiamo il protone è piccola (⇒ grande lunghezza d'onda), il protone rimane intatto, e semplicemente rimbalza via ….



Lo studio dettagliato di questo processo ha insegnato che il protone si comporta come un oggetto esteso, con un raggio di carica di $O(10^{-12}$ cm)

Esplorare la struttura del protone

Se l'energia trasferita è sufficiente, possiamo eccitare il protone, creando una **risonanza** barionica…



Lo studio di questo processo ha permesso di comprendere la natura della forza che tiene assieme i quarks

.... che decade in un protone ed un pione

La struttura del protone



Dentro il protone troviamo, oltre ai "quarks costituenti" **uud**, anche **gluoni** e coppie di **quark-antiquark** "virtuali"

Se sondiamo il protone a grandi energie, abbiamo una "foto" del protone ad alta risoluzione temporale, e possiamo rivelare la presenza di queste ulteriori componenti. In particolare, possiamo coinvolgere i gluoni e gli antiquarks nelle reazioni di piú alta energia.

Per Δt sufficientemente piccolo, possono apparire anche coppie quark-antiquark pesanti (per es. s-sbar, c-cbar)!! Possiamo trovare dentro il protone **quarks piú pesanti dello stesso protone!!**

Quarks inside a proton:
they can't be separated nor extracted from it. If we try, the energy we need to inject in the system is transformed into a new quark-antiquark pair, which screens the individual quark .....



As the energy put into the system becomes larger and larger (w.r.t. the quark masses), it is possible to form multiple quark-antiquark pairs, and the proton breaks up into a multitude of particles

Esempi di reazioni in collisioni fra protoni all'LHC

Quark-Quark scattering:





Real-life example of jets produced at the LHC

Esempi di reazioni in collisioni di protoni all'LHC

Produzione di un bosone W





Un protone agisce come campione, l'altro agisce come fascio di luce di un microscopio, iniettando l'energia necessaria per manifestare la struttura interna del campione… A priori i vettori di nuove interazioni fondamentali possono essere creati in questo modo, se la massa non e' troppo grande

Examples of reactions in proton collisions

gluon-gluon reactions:

gg → top antitop





The Higgs boson

La massa delle particelle elementari

$\mathbf{m=E/c^2}$ $\Rightarrow$ per un sistema composto, la massa e' ottenuta risolvendo le equazioni della dinamica dello stato legato, con

E=(energia cinetica) + (energia potenziale)

Dunque $m_p = 938$ MeV richiede di capire un "come", non un "perché"

Diverse le cose per particelle elementari: infatti

elementare $\Rightarrow$ nessuna dinamica interna

Occorre sviluppare una teoria che spieghi cosa sia la massa per particelle elementari, e che ne determini il valore particella per particella

Quanto è vuoto, il vuoto?

Il vuoto ed il campo di HIGGS

Il “vuoto” , cioè lo stato di riposo di ogni volume di spazio nell’universo, è occupato da una densità costante del campo di una particella, il bosone di Higgs”, che permea l’universo come un etere

Le interazioni delle particelle con questo campo di fondo, determinano, fra le altre cose, la loro massa

Il bosone di Higgs e la massa delle particelle elementari

La luce che si propaga in un mezzo "rallenta" a causa delle continue interazioni col mezzo stesso



Il tempo necessario per attraversare il mezzo e' maggiore che se la luce attraversasse il vuoto

$\Rightarrow c_{medium} < c_{vacuum}$

Il campo di Higgs e' un mezzo continuo in cui l'universo e' immerso. Le particelle, interagendo con esso, acquistano l'inerzia caratteristica delle particelle con massa.



$\mathbf{m \propto \lambda\, v}$

La quantita' **"v"** e' una proprieta' universale dello stato del campo di Higgs che permea l'universo.

La quantita' **"λ"** e' caratteristica della particella.
Grande λ vuol dire grande massa, con $\mathbf{m \propto \lambda\, v}$

Ora la domanda

"**perche' una certa particella ha massa m?**"

e' rimpiazzata da

"**perche' una certa particella si accoppia al campo di Higgs con intensita' $\lambda \propto m / v$?**"

Tuttavia almeno ora abbiamo un modello matematico per capire **come** le particelle acquistino massa

Note on "the mass of the Universe"

- proton's mass arises from QCD dynamics, not from the mass of its constituent quarks. Half of it is kinetic energy of the tightly bound relativisitic quarks, the other half is binding energy ($M=Ec^2$, $E=K+U$, virial theorem....)

- the mass of particles composing Dark Matter does not need to arise from the coupling with the Higgs. E.g. in Supersymmetry models it could mostly come from the breaking of supersymmetry, nothing to do with the Higgs

La produzione e rivelazione del bosone di Higgs

Come ogni altro mezzo continuo, il campo di Higgs puó essere perturbato. Come succede quando colpiamo un tavolo con un martello, creando onde sonore, se riusciamo a scuotere il campo di Higgs possiamo creare “onde di Higgs”. Queste “onde” si manifestano come “particelle”, il bosone di Higgs per l’appunto, secondo il solito principio di dualità onda-corpuscolo della meccanica quantistica.

Far ciò richiede concentrare in un piccolo volume particelle di massa grande (per avere una forte interazione col campo di Higgs) e con sufficiente energia

⇒ LHC !!!

Higgs: Four main production mechanisms



Gluon-gluon fusion



Vector boson fusion



Radiation from vector bosons



Radiation from top quarks

Higgs decays





f= quarks or leptons

V= W or Z



Esempio di processo di produzione dell'Higgs





Level-1 questions: Why?

- Why 3 families of quarks and leptons?
- Why some particles have mass?
- Why m(neutrino) ~ 10^{-7} m(e)?
- Why is there a matter-antimatter asymmetry in the Universe?
- Why $F_{gravity} \sim 10^{-40}\ F_{electric}$?
- Are particles really pointlike? Strings?? Membranes?
- Why D=3+1?
- .....
- Why something instead of nothing?

- "The Big Bang theory: an epistemological perspective", http://cern.ch/mlm/talks/Mangano-bigbang.pdf

  (*Talk at the Wilton Park Conference: The Big Bang and the interfaces of knowledge: towards a common language?)*

- "Visible and invisible in modern physics", http://cern.ch/mlm/talks/Mangano-Dali.pdf

  (*Symposium on `Art, science and Salvador Dali: from visible to invisible')*