


Tabletop 実験紹介

難波俊雄 (素粒子物理国際研究センター)


Tabletop 実験=

大型加速器を使わない(比較的)小規模実験


- 大型加速器(エネルギー・フロンティア実験)の苦手な実験(相補的)
- 高感度な検出器や特殊な量子ビームを武器にした実験



Tabletop実験で使う武器(1) いろんな光





強力なX線やX線自由電子レーザー





レーザー(赤外～紫外)
エネルギーや時間を自在に
(工学部・吉岡研)



Tabletop実験で使う武器(2) 粒子ビーム



Tabletop実験で使う武器(2) 高感度検出器



Tabletop 実験のメリット

基本的に一人一テーマ

- 自分自身のプロジェクト
自分のペースでできる!

- 企画、設計、製作、測定、解析すべてできる
研究者としての経験をつめる!

- 数年の短期間で物理的成果を上げる
論文という目に見える実績が挙げられる!
(当たればでかいが、外れても論文は書ける)




LHC実験 ⇄ Tabletop実験

掛け持ち/テーマ替えも可

例えば修士:Tabletop→博士:LHC


実験の例: ポジトロニウムのボース・AINシュタイン凝縮 (Ps-BEC)

反物質の新量子多体系である低温量子凝縮相 = 反物質レーザーを実現




基礎科学研究や次世代光源への応用

1. 反物質に働く重力を 原子干渉計を用いて測定




⇒ **重力**という**実験的**に**未探索**の切り口で物質・反物質の未知の非対称性を探り、「なぜ、宇宙に物質のみ残ったのか」とい**う究極の問い**に答える



2. 511 keV ガンマ線レーザー

Ps-BEC をナノ秒以下で自己消滅させ、出てくるガンマ線を光源に用いて**ガンマ線レーザー**を実現。






⇒ ガンマ線・ガンマ線散乱実験、新たなエネルギー領域の量子光学研究、高分解能撮像による産業・医療応用

Ps-BEC・ガンマ線レーザー実現スキーム

新技術 3つを開発中

(東大・工や九州大、産総研、KEK、JAEAと協力して約20人の共同研究)

- (1) Ps生成・濃縮・冷却ナノ反応器に
- (2) 高密度陽電子ビームを打ち込んで高密度 Ps を生成し、
- (3) レーザー冷却によって Ps-BEC を実現



← KEK の陽電子ビームラインで
世界初 Ps レーザー冷却実験に挑戦中！

実験の例: 光と光をぶつける

電子や陽子の代わりに光と光をぶつけて、**真空の場**を励起する

励起する候補

- ダークエネルギー?
 - Dilaton/Axion?
 - QED(仮想電子対)
 - ??(MeVの物理)
 - QCD(QGP)
 - 電弱真空(Higgs)
- μeV? meV??
keV
MeV
100GeV





光を使うメリット

- 自分自身が反粒子 = 100% エネルギーとして利用できる
- コヒーレンシーが利用できる
- レーザーや光検出技術の飛躍的進歩

これまでいろいろな「光」をぶつけて実験
使ってきた/使う予定の光源

- X線自由電子レーザー (SACLA) 硬X線/軟X線
- SACLA同期500TWレーザー
- 高精度共振器中に数十万倍蓄えた光
- (光じゃないけど)強力なパルス磁石




X線とレーザーをぶつけるところ

これまでいろいろな「光」をぶつけて実験 使ってきた/使う予定の光源

- X線自由電子レーザー (SACLA) 硬X線/軟X線
- SACLA同期500TWレーザー
- 高精度共振器中に数十万倍蓄えた光
- (光じゃないけど)強力なパルス磁石

パルス磁石

強磁場で真空をわずかに歪ませる




@本郷 B2F

新しい光源やぶつけかたの
改良で今後も感度を向上させる


実験の例: 暗黒物質探し

- 暗黒物質ハロー



パラフォトン暗黒物質 ミラーでミリ波に変換して検出

球面ミラー




ミラー




球面ミラーで暗黒物質→ミリ波変換

超伝導SIS検出器
(ALMAで使用)






スペクトルのピークを探す




WIMP暗黒物質から予想される電波信号を探索

りゅう座矮小銀河




暗黒物質が対消滅し、最終的に電波を放出する



実験の例: 超冷中性子を使った弱い等価原理の検証

超冷中性子を使えば、重力による量子化準位が見える!



超冷中性子を利用して、量子論の範疇で、弱い等価原理(慣性質量=重力質量)を検証できないか?


系のスケール:

$$z_0 = \left(\frac{\hbar^2}{2m_i m_g g}\right)^{1/3} \sim 6 \text{ } \mu\text{m}$$
$$E_0 = \left(\frac{m_g^2 g^2 \hbar^2}{2m_i}\right)^{1/3} \sim 0.6 \text{ peV}$$

m_g : gravitational mass

m_i : inertial mass

超冷中性子を「自由落下」させて、量子力学的時間発展を追えれば、弱い透過原理を検証できる




時間発展 :

$$\psi_{(z,t=0)} = a_1 \phi_{1(z)} + a_2 \phi_{2(z)}$$


$$|\psi_{(z,t)}|^2 = |\psi_{(z,t=0)}|^2 - 4a_1 a_2 \phi_{1(z)} \phi_{2(z)} \sin^2 \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{2} t$$

energy scale
oscillating term


CMOS をベースにしたセンサー開発




Position resolution : < 4 microns
Readout time : ~ msec





高エネルギー加速器研究機構 などで開発



Gpixel Inc.



実験の例: ブラックホールの量子性を実験的に調べたい



銀河中心のホライズン

ホライズンでの振る舞い???


現実のブラックホールはよく知られたSchwarzchild BHではなく、回転している(Kerr)
Double horizon構造が発生し、Hawking輻射の共鳴が起こる

特殊な実験系でこの幾何学構造を再現し


- BHの量子性を探る
- BHを利用した新たなデバイスを作る

いろんな系でホライズンを作る


Spin wave



Light vortex




Circuit network



量子コンピュータ

量子もつれを介して情報がどう伝わっていくか??



他の実験もいろいろやってます

- やってる/やってきた実験テーマ
 - ポジトロニウム関係の実験いっぱい
(ポジトロニウムのエキスパート)
 - 暗黒物質探し
(アクションやパラフォトンなど)
 - 超伝導を利用した高感度検出器の開発



- もちこみのアイデアも歓迎
- 自分に合った実験を探していきましょう
- 希望する人は、**A2浅井研・素粒子センターの教員**を志望して、面接で小実験を希望して下さい

この後 15:30 から浅井研オープンラボ

ミーティングID: 815 7982 8664 パスコード: 135356

<http://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/~asai/>



5/28 13:30-15:30 素粒子センターガイダンス

登録・情報は [ここ](#)

5/28 15:30-17時ころ オープンラボ

ZOOMは [ここ](#)

ミーティングID: 815 7982 8664 パスコード: 135356

