

Workshop RENAFAE 2018

Monday, 30 July 2018 - Tuesday, 31 July 2018

Instituto de Física da Universidade de São Paulo



Book of Abstracts

Contents

Status of the contribution of CBPF to the new Tracker of LHCb experiment	1
Atividades Gaúchas de divulgação da Ciência	1
The Giant Radio Array for Neutrino Detection (GRAND)	1
Status of the JUNO observatory and Brazilian contribution	2
Santos Dumont: uma infraestrutura computacional à serviço do desenvolvimento científico e tecnológico	2
Sirius: Desafio da instrumentação científica no Brasil	2
Paralela	2
Paralela	2
Abertura do Workshop	3
Status do experimento de raios cósmicos CREAT na Antartica	3
programa Beam-Line-4-Schools no Brasil	3
Status of The Coherent Neutrino Nucleus Interaction Experiment (CONNIE)	3
Status of the contribution of CBPF to the new Tracker of LHCb experiment	4
Brazilian participation in the Middle and Large Size Telescopes of the Cherenkov Telescope Array	4
Brazilian Participation on the Resistive Plate Chambers (RPC) upgrade project of the CMS muon system	5
Search for Higgs boson pair-production in the $bb\tau^+\tau^-$ decay channel with the ATLAS detector	5
Apresentação do Cluster SAMPA	6
Uma Leitura com Fotomultiplicadoras Multi-Anodos para se Atingir uma Granularidade Mais Fina com o Principal Calorímetro Hadrônico do ATLAS	6
Promoting Diversity at CERN and within CMS - the work of the Diversity Office	7
The CMS-TOTEM Precision Proton Spectrometer and first physics results	7
PPS offline software in CMS	8

ATLAS Open Data e Master Class: Contribuindo para a Formação Acadêmica e a Divulgação Científica	8
Investigations of the photo-production of low- and high-mass systems with the CMS detector	8
Contribuição brasileira ao Muon Forward Tracker do ALICE/CERN	9
The PPS Offline Conditions Database in CMS	9
Detecção de elétrons baseada na fatoração de matrizes não-negativas	10
Standard Model precision measurements in the ATLAS experiment	11
VBF Higgs Boson Production at CMS	11
Detecting cosmic rays in high schools: an experimental approach for particle physics outreach activities in Sao Paulo	11
Study of the Single Event Effects on ATLAS Liquid Argon Calorimeter Fase-I electronics	12
Trigger de Elétrons do ATLAS em Região de Baixa Energia Usando Redes Neurais	12
O laboratório de instrumentação do High Energy Physics and Instrumentation Center na USP	13
Avaliação para o Experimento ATLAS de Otimização por Pré-Processamento de Identificação de Elétrons	13
Studies of central diffractive production of open charm with CMS and TOTEM experiments.	14
Redes Neurais Especialistas para Fusão de Múltiplas Representações de Informação	14
Intervenções Baseadas em Calorimetria Para o Sistema de Filtragem Online de Elétrons e Múons do ATLAS Durante a Run 2	15
Status of the Neutrinos Angra Experiment	16
Search for Long-Lived Gluinos in Compressed SUSY Scenarios	16
Prospects on semileptonic WW CEP in aQGC scenarios at CMS	17
Medições de quarks pesados do HEPIC@IFUSP no experimento ALICE	17
Desenvolvimentos, construção, instalação e operação de RPC para a próxima geração de experimentos de astropartículas	18
Particle Physics Outreach Activities at IFUSP: dialogues with the schools	18
O uso de HPCs pelo LHCb/CERN	19
Physics with jets at LHCb	19
Central exclusive production at LHCb	20
Física do charm no LHCb	20

Charge-Parity asymmetry in B mesons decays to three- body charmless final states at LHCb experiment	20
Decobrando a Física de Partículas	21
Discussão sobre a participação brasileira no IPPOG	21
Escola de Física CERN	21
O IPPOG Masterclasses, e a Divulgação Científica, promovidos pela UERJ, COPPE-UFRJ, UFLA, UFRN, IFRN e IFCE	22
b- and c-Jet Energy Corrections in the Higgs Decay	23
A multivariate selection of charmless B+ decays to three mesons in LHCb detector	23
Estudo do novo código de evolução hidrodinâmica aplicado em colisões de íons pesados	24
Color reconnection effects on resonance production	24
Search for Diboson Resonances with the CMS experiment	24
Search for Dark Matter with the CMS experiment	25
MIPWA usando GooFit	25
Implementation of an IPMC and Linux box over Xilinx Zynq MPSoC for ATCA blades of the Backend Hardware Platform Prototype	26
Electronics development for the upgrade of the CMS tracker	26
Atividades de Outreach desenvolvidas pelo SPRACE	27
Research activities of the SPRACE heavy ions group	27
A próxima geração das redes da RNP	27
Serviços para suporte à eCiência	28
ATLAS Liquid Argon Electromagnetic Calorimeter Upgrade Activities	28
Use of small photomultiplier tube to extend dynamic range of Pierre Auger Observatory surface detector	28
RPC Tower for the Upgrade of the Pierre Auger Observatory	29
The Deep Underground Neutrino Experiment: Photon Detection System and ARAPUCA	29
ESTIMAÇÃO DA ENERGIA DO CALORÍMETRO DE TELHAS DO ATLAS EM CONDIÇÕES SEVERAS DE EMPILAHMENTO DE SINAIS	30
HEP and Machine Learning Synergy - an overview of ML initiatives in the HEP field	30
Measuring multi-strange hadron in heavy-ion collisions at the LHC with ALICE	31
Trigger de Muons Assistido pelo TileCal	31
BR-SP-SPRACE WLCG Tier-2 Cluster	32

Status do experimento Modulation no CBPF	32
On the spectrum of antihydrogen: characterization of the 1S-2S transition	32
Filtragem Offline de Elétrons Baseada em um Ensemble de Redes Neurais Especislistas	33
#Abstract em submissão	33
Trigger de Muons Assistido pelo TileCal	33
Divulgação científica para o grande público: concepção, planejamento e conteúdo do projeto Uniso Ciência	34
Plenária Análise de Dados	34
Plenária Instrumentação	34
Plenária Computação	35
Plenária Divulgação Científica	35

Instrumentação / 2**Status of the contribution of CBPF to the new Tracker of LHCb experiment**

Authors: André Massafferri¹; Ulisses Carneiro²

¹ CBPF

² CEFET-RJ

Corresponding Authors: ulissestv@gmail.com, massafferri@cbpf.br

After many years of R&D the new Tracker of the LHCb experiment, one of the main components of its upgrade, based on thin scintillators fibers coupled to SiPM, named SciFi project, has recently started in production phase. I will review the SciFi project, concentrating on the description of the new Front-end electronics and the test suite mass-production results, the main CBPF contribution.

Divulgação Científica / 3**Atividades Gaúchas de divulgação da Ciência**

Authors: Gustavo Gil Da Silveira¹; Fernanda Mossi Haiduk²

Co-author: Rafael Pezzi³

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)

² Universidade Federal do Rio Grande do Sul

³ Univ. Federal do Rio Grande do Sul (BR)

Corresponding Authors: fernanda.haiduk@ufrgs.br, rafael.pezzi@ufrgs.br, gustavo.silveira@cern.ch

De forma a divulgar e popularizar a Física de Partículas e as investigações levadas a cabo no Grande Colisor de Hádrons do CERN, os grupos experimentais do CMS e do ALICE do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) se uniram para promover um projeto piloto de divulgação junto a estudantes de Ensino Médio de escolas do Rio Grande do Sul. Este projeto visa promover atividades em escolas de Ensino Médio de cunho informativa, bem como experimentos que revelem a natureza das partículas elementares. Atividades desta natureza se propõem a motivar a participação de estudantes na Masterclass a ocorrer na UFRGS em 2019, tendo como público-alvo estudantes do terceiro ano do Ensino Médio com o objetivo de ser uma atividade de incentivo ao ingresso na carreira científica.

Instrumentação / 4**The Giant Radio Array for Neutrino Detection (GRAND)**

Author: Rafael Alves Batista¹

¹ University of São Paulo

Corresponding Author: 8rafael@gmail.com

Ultra-high-energy extraterrestrial neutrinos can be used to study energetic processes taking place in the vicinity of astrophysical objects and in the intergalactic medium. They are useful to search for signs of Beyond the Standard Model physics, since energies of $E > 10^{17}$ eV cannot be attained

by current particle accelerators.

The Giant Radio Array for Neutrino Detection (GRAND) will detect extensive air showers induced by the decay of tau leptons due to the interaction of high-energy neutrinos with the surface of the Earth. It consists of an array of antennas covering an area of 200000 km². The projected integrated 10-year all-flavour sensitivity is $\sim 4 \times 10^{-11}$ GeV cm⁻² s⁻¹ above 4×10^{17} eV, with sub-degree angular resolution. The detection of cosmogenic neutrinos with GRAND is guaranteed. Moreover, sources of neutrinos produced in ultra-high-energy cosmic-ray accelerators are also expected to be detected. In this talk I will present the preliminary design and the physics capabilities of the experiment, as well as the status of the ongoing efforts.

Instrumentação / 5

Status of the JUNO observatory and Brazilian contribution

Author: Pietro Chimenti^{None}

Corresponding Author: pietro.chimenti@gmail.com

The Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) is a 20 kiloton liquid scintillator detector to be placed 700-meter deep underground at 52.5Km from 10 nuclear reactors delivering at present 26.6TW of thermal power. The detector, designed for an unprecedented 3% energy resolution at 1MeV, has a rich physics potential including the determination of the neutrino mass hierarchy, improvement of precision of oscillation parameters, observation of supernovae and geo-neutrinos and so on. Control of the systematics of the energy response is crucial to archive the designed energy resolution as well as to reach 1% precision of the absolute energy scale. For this reason there are ~18,000 20-inch photo-multiplier tubes (PMTs) in the central detector with an optical coverage greater than 75%. MA Small-PMT system of 3-inch PMT has been approved to provide a unique way to calibrate the energy response. After an overview of the observatory, the physics concept of double calorimetry will be discussed. Finally the contribution of Brazilian institutions to this international effort will be described.

6

Santos Dumont: uma infraestrutura computacional à serviço do desenvolvimento científico e tecnológico

7

Sirius: Desafio da instrumentação científica no Brasil

8

Paralela

9

Paralela

10

Abertura do Workshop

Corresponding Authors: munhoz@if.usp.br, bediaga@cbpf.br

Instrumentação / 11

Status do experimento de raios cósmicos CREAT na Antartica

Authors: André Massafferri Rodrigues¹; Leonardo Guedes¹; Marcos Koebcker¹; Heitor Evangelista²; Heber Passos³; Ulisses Carneiro⁴; Rafael Macedo¹

¹ CBPF

² UERJ

³ INPE

⁴ CEFET

Corresponding Authors: rmacedo@outlook.com, evangelista.uerj@gmail.com, hbmeteoro@hotmail.com, ulissestv@gmail.com, leocrgster@gmail.com, marcosvk@cbpf.br, massafferri@cbpf.br

Vou apresentar o status do projeto CREAT (Cosmic Ray Experiment at Antarctic) dedicado a estudar possíveis correlações entre a incidência de raios cósmicos e formação de nuvens. Este projeto, dividida em 3 fases, tem uma versão piloto tomando dados de fluxo de raios cósmicos desde 2014 na estação Criosfera 1 na latitude 84, a 640km do Polo Sul. A segunda fase deve ser instalada este ano e consiste no upgrade da versão piloto. A terceira fase consistirá na instalação de um telescópio de muons, com medidas de fluxo, distribuição e energia, representando a componente de mais alta energia, e de um detector de neutrons, cobrindo o espectro de baixa energia.

Divulgação Científica / 12

programa Beam-Line-4-Schools no Brasil

Author: André Massafferri Rodrigues¹

¹ CBPF

Corresponding Author: massafferri@cbpf.br

Beam-Line-for-Schools consiste em programa anual de divulgação científica do CERN no qual equipes formadas por estudantes de nível-médio são estimuladas a submeter propostas criativas para a realização de medidas utilizando o feixe PS e de um conjunto de detectores do CERN. As 2 melhores propostas do mundo são premiadas com a execução das propostas por 2 semanas. Motivado por essa iniciativa desde 2016 alguns grupos brasileiros vem submetendo propostas. Vou apresentar a experiência que tivemos no CBPF e uma proposta de sincronizar os esforços no sentido de agregar mais pessoas e estimular a cultura da instrumentação em física de altas energias.

Análise de Dados / 13

Status of The Coherent Neutrino Nucleus Interaction Experiment (CONNIE)

Author: Irina Nasteva¹

Co-authors: Carla Bonifazi²; Martin Makler³; Herman Pessoa Lima Junior⁴; Philippe Mota⁵

¹ *Federal University of Rio de Janeiro (BR)*

² *IF-UFRJ*

³ *CBPF*

⁴ *Instituto de Física*

⁵ *Goethe Universität Frankfurt*

Corresponding Authors: philipe.mota@gmail.com, herman.lima.junior@cern.ch, bonifazi@if.ufrj.br, irina.nasteva@cern.ch, martinmakler@gmail.com

Coherent elastic neutrino-nucleus scattering (CENNS) is an interaction process that was predicted by the Standard Model but only recently was observed. Although its cross-section is coherently enhanced at low neutrino energies, the resulting keV-range nuclear recoil energies are below the thresholds of most detectors. The detection of coherent scattering with different experimental techniques is of significant interest, since it can act as a probe for physics beyond the Standard Model and may also be useful to monitor nuclear power plants. The measurement of CENNS will increase our knowledge on a limiting background for future dark matter searches and is useful in understanding the supernovae processes.

The Coherent Neutrino-Nucleus Interaction Experiment (CONNIE) uses fully depleted high-resistivity CCDs (charge coupled devices) as particle detectors with the goal of measuring for the first time CENNS of reactor antineutrinos with silicon nuclei. The CONNIE detector has been operating since 2014 at a distance of 30 m from the core of the Angra II 3.8 GW nuclear reactor in Angra dos Reis, RJ, Brazil. The detector has demonstrated stable operation, low noise of less than 2e- RMS, and low background contamination levels achieved using passive shielding. In 2016 the experiment was upgraded, increasing its active mass from 4 g of silicon to 80 g, and implementing a number of improvements on the control and operations. We will report on the performance of the CONNIE detector, preliminary results from the current data, and future perspectives for detecting CENNS.

Instrumentação / 15

Status of the contribution of CBPF to the new Tracker of LHCb experiment

Authors: Andre Massafferri Rodrigues¹; Diogo Ayres Rocha¹; Ulisses De Freitas Carneiro Da Graca¹

¹ *CBPF - Brazilian Center for Physics Research (BR)*

Corresponding Authors: u.carneiro@cern.ch, andre.massafferri.rodrigues@cern.ch, diogo.ayres.rocha@cern.ch

After many years of R&D the new Tracker of the LHCb experiment, one of the main components of its upgrade, based on thin scintillators fibers coupled to SiPM, named SciFi project, has recently started in production phase. I will review the SciFi project, concentrating on the description of the new Front-end electronics and the test suite mass-production results, the main CBPF contribution.

Instrumentação / 16

Brazilian participation in the Middle and Large Size Telescopes of the Cherenkov Telescope Array

Authors: vitor de souza¹; Ulisses Barres²

¹ ifsc-usp² Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas**Corresponding Authors:** ulisses@cbpf.br, vitor@ifsc.usp.br

In this talk we will present the development of instrumentation and analysis methods developed by several scientists in Brazil in connection with the Middle and Large Size telescopes of the CTA Observatory.

Instrumentação / 17

Brazilian Participation on the Resistive Plate Chambers (RPC) upgrade project of the CMS muon system

Author: Sandro Fonseca De Souza¹¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)**Corresponding Author:** sandro.fonseca@cern.ch

The Resistive Plate Chambers (RPC) are used in the barrel and forward region of the CMS muon system. They provide a muon trigger and are used in the muon trajectory reconstruction.

The future increase of the LHC luminosity (HL-LHC) imposes a challenge to the RPC system. In order to cope with the new conditions, an upgrade is planned. In the forward region, two additional RPC stations called RE3/1 and RE4/1, based on improved RPC technology will be installed. The link boards of the present RPC detectors will be upgraded allowing better time resolution and higher rate capabilities.

During the last years, several studies on the performance of new technologies and configurations have been done using Monte-Carlo simulations and testing new detectors in the Gamma Irradiation Facility at CERN. The results indicate that the technology to be used for the extension of the RPC system is HPL double gap RPC.

This talk will present the main activities are developing by Brazilian groups, in the special of the UERJ and UNICAMP, on RPC upgrade project Phase I and our proposal the contribution for the RPC Upgrade Phase II program will be finished with the installation of the chambers during the Yearly Technical Stops at the end of 2022 and 2023.

Análise de Dados / 18

Search for Higgs boson pair-production in the $bb\tau^+\tau^-$ decay channel with the ATLAS detector

Author: Marisilvia Donadelli¹¹ Universidade de Sao Paulo (BR)**Corresponding Author:** marisilvia.donadelli@cern.ch

In this talk we present a search for resonant and non-resonant Higgs boson pair-production decaying to $bb\tau^+\tau^-$, considering the semi-leptonic and fully hadronic final states of the τ -leptons. The analysis uses 36.1 fb^{-1} of data collected by the ATLAS experiment at the LHC in 2015 and 2016 at a centre-of-mass energy of $\sqrt{s} = 13 \text{ TeV}$. The inclusion of the fully hadronic decay channel in this analysis further improves the sensitivity of the $hh \rightarrow bb\tau^+\tau^-$ decay in contrast with Run-1 results. Results for non-resonant Higgs pair-production are compared to Standard Model predictions.

The data are also analyzed to probe resonant Higgs pair production, constraining a model with an extended Higgs sector based on two doublets and a Randall-Sundrum bulk graviton model.

Computação / 19

Apresentação do Cluster SAMPA

Author: Ricardo Romao da Silva¹

¹ *Instituto de Física - USP*

Corresponding Author: ricardo.romao.da.silva@cern.ch

Serão apresentados os recursos computacionais e infraestrutura física e lógica do cluster SAMPA e sua participação no WLCG.

Instrumentação / 20

Uma Leitura com Fotomultiplicadoras Multi-Anodos para se Attingir uma Granularidade Mais Fina com o Principal Calorímetro Hadrônico do ATLAS

Authors: Philipp Gaspar¹; Creison Nunes¹; Jose Seixas¹

¹ *Federal University of Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Authors: seixas@lps.ufrj.br, creison.mike@poli.ufrj.br, philipp.gaspar@cern.ch

A segunda fase do *upgrade* do LHC terá uma luminosidade integrada dez vezes maior (3000 fb^{-1}) que os dados coletados durante as *Runs I-III*, em conjunto. Com isso o *upgrade* do principal calorímetro hadrônico do ATLAS (TileCal), durante o regime de alta luminosidade, inclui uma renovação completa da sua eletrônica, porém sem alterar as características mecânicas e óticas do detector. Atualmente, as telhas cintilantes do TileCal são agrupadas com o objetivo de formar as células do calorímetro. Assim, o TileCal possui uma resolução geométrica que é determinada pelo tamanho de suas células e a quantidade de fibras acopladas às suas fotomultiplicadoras. Contudo, há uma possibilidade técnica de utilizar informações individuais de cada uma das telhas, a fim de tornar mais fina a granularidade do detector, modificando apenas a forma da leitura do sinal ótico do calorímetro sem alterar sua parte mecânica.

Jatos de partículas com alto momento transversal tendem a depositar sua energia em camadas mais profundas do calorímetro. Portanto, ao dividir estas células em diferentes sub-regiões, será possível adquirir, com mais detalhes, o perfil longitudinal dos jatos. Além disso, melhorias na reconstrução do momento, massa e medidas de posição angular dos jatos, juntamente com outras variáveis como energia transversal, também serão beneficiadas por um detector de granularidade mais fina. Para isto, deseja-se empregar, para cada célula, um tubo fotomultiplicador com capacidade de leitura multi-anodo, que é capaz de ler o sinal de cada fibra individualmente e, assim, obter informação adicional da distribuição de energia depositada numa célula.

O processamento de sinais desenvolvido objetiva associar a imagem formada na fotomultiplicadora multi-anodal a uma região espacial da célula em questão. Métodos de separação cega de fontes estão sendo aplicados. Em particular, a Fatoração Não-Negativa de Matrizes (*NMF*), devida à restrição de dados não-negativos ser uma característica dos *pixels* que formam as imagens na fotomultiplicadora. Introduzindo esparsidade aos fatores da *NMF*, podemos interpretar a técnica como um método de *clusterização*, que associa uma sub-região da célula a um determinado *cluster*. A Análise de Componentes Independentes (*ICA*) também foi aplicada com o objetivo de estimar os sinais originais de cada uma das telhas, a partir das misturas lineares das fontes. Resultados preliminares mostram uma

possível separação da célula em sub-regiões direita e esquerda, tornando possível uma granularidade duas vezes mais fina que a atual.

Divulgação Científica / 21

Promoting Diversity at CERN and within CMS - the work of the Diversity Office

Author: Clemencia Mora Herrera¹

¹ *Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Author: clemencia.mora.herrera@cern.ch

The mandate of the diversity office (DO) of CERN and within the LHC experiments is to promote the diversity of gender, geographical regions and ethnicities, orientation, and minorities in general. The CMS DO was established in August 2017.

Activities on international women's day to bring awareness to female colleagues and participating in the first LGBTQ in STEM day are some of the actions taken by the DO.

The DO also monitors the diversity dataset within the collaboration with periodic analyses of the distribution of age, gender and region of the members, and contributes in avoiding instances of harassment or discrimination of collaboration members (micro-aggressions or biased behaviour during meetings, bad-tasted humour in talks given on behalf of the collaboration, etc.) by working on establishing a code of conduct and channels for safe reporting of misconduct at conferences, for example.

Análise de Dados / 22

The CMS-TOTEM Precision Proton Spectrometer and first physics results

Author: Antonio Vilela Pereira¹

¹ *Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Author: antonio.vilela.pereira@cern.ch

The CMS-TOTEM PPS (Precision Proton Spectrometer) detector system consists of silicon tracking stations as well as timing detectors to measure both the position and direction of protons and their time-of-flight with high precision. They are located at around 200 m from the interaction point in the very forward region on both sides of the CMS experiment. PPS is built to study Central Exclusive Production (CEP) in proton-proton collisions at LHC, including the photon-photon production of W and Z boson pairs, high-mass diphoton and dilepton production, high- p_T jet production, as well as searches for anomalous couplings and new resonances.

The PPS detector has taken data at high luminosity while fully integrated to the CMS data acquisition system. The total data collected correspond to around 55 fb^{-1} during its first two years of operation. In this presentation the PPS operation, commissioning and performance are discussed.

For the first time, exclusive dilepton production at high masses has been observed in the CMS detector while one or two outgoing protons are measured in PPS using around 10 fb^{-1} of data accumulated in 2016 during high-luminosity LHC operation. These first results show a good understanding, calibration and alignment of the new PPS detectors. Preliminary results on the search for high-mass exclusive diphoton production and prospects for future analyses are also presented.

Computação / 23**PPS offline software in CMS****Author:** Dilson De Jesus Damiao¹**Co-authors:** Luiz Martins Mundim Filho ¹; Maria Elena Pol ²; Helena Brandao Malbouisson ¹; Clemencia Mora Herrera ¹; Helio Nogima ¹; Sandro Fonseca De Souza ¹; Wagner De Paula Carvalho ¹¹ *Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)*² *CBPF - Brazilian Center for Physics Research (BR)***Corresponding Authors:** maria.elena.pol@cern.ch, wagner.de.paula.carvalho@cern.ch, luiz.mundim@cern.ch, helio.nogima@cern.ch, clemencia.mora.herrera@cern.ch, helena.malbouisson@cern.ch, dilson.de.jesus.damiao@cern.ch, sandro.fonseca@cern.ch

PPS (Precision Proton Spectrometer) is a detector localized around 200 m from the colliding point at CMS, with the purpose of detecting the scattered protons.

It is composed of different sensitive detectors, tracking detectors, such as silicon strips and pixels, and detectors for time of flight measurement like diamond and ultra fast silicon detectors.

The CMS Rio group is working in the PPS offline software since the Technical Design Report, when a first version of the Fast Simulation was implemented.

The main contributions in the software are in the elaboration of the Fast Simulation, the transport of the simulated protons from the interaction point to the entrance of the PPS detectors, the integration of the Full Simulation into CMSSW, code implementation for detector Database access and participation in the Pixel simulation code.

Divulgação Científica / 24**ATLAS Open Data e Master Class: Contribuindo para a Formação Acadêmica e a Divulgação Científica****Authors:** Marco Lisboa Leite¹; Marisilvia Donadelli¹; Suzana Salem Vasconcelos²¹ *Universidade de Sao Paulo (BR)*² *Universidade de Sao Paulo***Corresponding Authors:** marco.leite@cern.ch, marisilvia.donadelli@cern.ch

O Projeto *Atlas Open Data* e o evento *Master Class - Hands on Particle Physics* têm sido conduzidos pelo grupo ATLAS - USP com o objetivo de orientar e treinar estudantes de iniciação científica ligados ao *Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo*. Os alunos desenvolvem projetos de análise de dados reais e de simulação Monte Carlo disponibilizadas pela Colaboração ATLAS através do *Atlas Open Data* e que correspondem ao período de colisões *pp* a $\sqrt{s} = 8$ TeV do LHC. O Projeto *Atlas Open Data* e a participação destes estudantes no *Master Class* contribuem para o desenvolvimento das habilidades necessárias a um físico(a) experimental de altas energias no sentido de prepará-lo(a) para interagir junto a uma colaboração internacional, de fundamental valor para o intercâmbio de resultados, avanço do conhecimento, além de divulgação científica.

Análise de Dados / 25**Investigations of the photo-production of low- and high-mass systems with the CMS detector**

Authors: Gustavo Gil Da Silveira¹; Miguel Medina Jaime¹

¹ *Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Authors: miguel.medina.jaime@cern.ch, gustavo.silveira@cern.ch

The high-energy proton-proton collisions at the LHC can be used to investigate the electromagnetic interactions as a photon collider. Such production mechanism considers the long-range interactions via photon fusion, which allowed the CMS Collaboration to study the two-photon production of dileptons and dibosons at 7 and 8 TeV. In particular, the kinematics accessible by the CMS detector also provides the means to investigate high-order photon interactions, such that the light by light scattering in heavy-ion collisions. As a complementary production mechanism, the photon-proton interaction is an interesting way to study the elastic and nonelastic production of resonances, like vector mesons and vector bosons. In this case, the diffractive interaction by Pomeron exchange is employed to describe the colorless interaction between the photon and the colliding proton. The latest results on photo-production of resonances at CMS are reported, presenting the estimations for low- and high-mass channels in proton-proton and proton-Lead collisions. These results include the comparison of the estimated photon-proton cross section to the results from other experiments.

Instrumentação / 26

Contribuição brasileira ao Muon Forward Tracker do ALICE/CERN

Authors: Rafael Pezzi¹; Luis Gustavo Pereira²; Maria Beatriz De Leone Gay²

¹ *Univ. Federal do Rio Grande do Sul (BR)*

² *Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul (BR)*

Corresponding Authors: beatriz.gay@cern.ch, rafael.pezzi@ufrgs.br, lgp@if.ufrgs.br

Será descrito o Muon Forward Tracker (MFT) de ALICE e a contribuição do Grupo Experimental de Físicas de Altas Energia (GEFAE) da UFRGS no seu desenvolvimento. O MFT é um detector do tipo pixel de silício projetado para aprimorar a resolução na determinação dos vértices das trajetórias observadas pelo espectrômetro de múons do detector ALICE/CERN. É composto por 10 planos de sensores totalizando 469 Megapixels e será instalado durante o LS2 do LHC, próximo ao ponto de interação dos feixes. Os dados coletados pelo MFT serão essenciais para elucidar o comportamento de J/Ψ com $p_T < 3\text{GeV}$, com destaque à separação dos sinais correspondentes aos J/Ψ originários no ponto de interação daqueles provenientes de mésons B, de maior vida média, através do seu canal de ouro $B \rightarrow J/\Psi + X$. O GEFAE tem contribuído para o aprimoramento e confecção de estruturas de suporte do detector, particularmente o Patch Panel, além do sistema de reconstrução das trajetórias e simulação do detector que demandará novo software regido por O2. Implementamos modelo de fotoprodução de mésons pesados em UPC e PC com predição para pp, pA e AA. Buscamos desenvolver análise neste setor.

Computação / 27

The PPS Offline Conditions Database in CMS

Authors: Helena Brandao Malbouisson¹; Clemencia Mora Herrera¹

Co-authors: Helio Nogima¹; Diego Figueiredo¹; Wagner De Paula Carvalho¹

¹ *Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Authors: clemencia.mora.herrera@cern.ch, diego.figueiredo@cern.ch, helio.nogima@cern.ch, wagner.de.paula.carvalho@cern.ch, helena.malbouisson@cern.ch

The development of the conditions database for the CMS PPS (Precision Proton Spectrometer) sub-detector – which started on February 2016– has been an effort taken mainly by members of the CMS/UERJ group.

The task required first gathering the information on the needs of the subsystem, design, code development and integration with CMSSW, as well as interfaces with online DB through DAQ applications and other tools. The DB also needs maintenance, for example to load new calibration constants or information on new detector packages.

In this talk we will present the challenges and successes of this endeavour.

Instrumentação / 28

Detecção de elétrons baseada na fatoração de matrizes não-negativas

Authors: Jose Seixas¹; Julio De Castro Vargas Fernandes¹

¹ *Federal University of Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Authors: julio.de.castro.vargas.fernandes@cern.ch, seixas@lps.ufrj.br

O algoritmo Ringer atua no segundo nível de Trigger do detector ATLAS e visa explorar a geometria cônica das formas do chuveiro de elétrons (sinal) e jatos (background), usando as células do calorímetro ATLAS para construir anéis concêntricos de deposição de energia em torno da célula de deposição máxima de energia. Este processo preserva a informação lateral e longitudinal da forma do chuveiro e, portanto, a interpretação da física, ao mesmo tempo em que reduz a quantidade de informação em relação ao uso de todas as células de uma Região de Interesse (ROI). A soma das energias das células no anel sobre a soma das energias das células em todos os anéis (normalização por energia total) formam um vetor de quantidades discriminantes que pode ser apresentado a etapa seguinte que realiza um teste de hipóteses, de modo a determinar se o evento deve ser mantido para análise offline ou descartado. No caso do Ringer, um conjunto de redes neurais realiza esta etapa, atuando em setores determinados pela pseudorapidez e pela energia transversa. Note que este approach caracteriza uma técnica de ensemble de redes neurais, neste caso um ensemble geográfico já que cada rede fica responsável por um bin no espaço de fase $\eta \times E_t$. O algoritmo Ringer é o algoritmo utilizado pela colaboração na etapa rápida do Trigger e começou a atuar em 2017.

A inovação neste trabalho é a utilização de uma técnica de extração cega de fontes (BSS - Blind Source Separation) para a extração de uma base de componentes físicas, que seja capaz de descrever a estrutura das interações eletromagnéticas do sinal e as interações hadrônicas do background. Deste modo o que está sendo proposto é a obtenção de dois codebooks, um para o sinal e outro para o background, que representem as fontes físicas que compõem os eventos (sinal e background). Para extrair tais codebooks primeiro filtramos os dados disponíveis com um critério tight (Offline) para o sinal, de modo que os eventos escolhidos sejam uma amostra pura de elétrons, enquanto que o background é escolhido de tal forma que não passe nem no veryloose (Offline), sendo realmente eventos muito hadrônicos e subsequentemente aplicamos a técnica de BSS em cada conjunto separadamente visando encontrar um codebook para o sinal e outro para o background.

A fatoração de matrizes não-negativa (NMF) tornou-se uma ferramenta amplamente utilizada para a análise de dados de alta dimensão, pois extrai automaticamente características significativas (positivas) de um conjunto de vetores de dados não negativos. Além disso, as técnicas de separação cega de fontes tem sido muito aplicadas em problemas de classificação como pré-processamento. Entre essas técnicas a NMF tem se destacado, sendo um dos principais motivos para tal que as fontes extraídas da NMF serem positivas, o que permite uma interpretação física das mesmas. Como neste trabalho, usamos a energia de deposição do evento em uma estrutura anelada a NMF se mostra como uma escolha natural como pré-processamento (já que não existe energia negativa) e pode ainda prover insights sobre a física do problema através do estudo das fontes extraídas.

Uma vez extraídas as fontes de sinal e background, montamos uma base estendida, compondo as fontes da base de sinal com as de background, de modo a projetarmos os sinais de calorimetria

referentes às colisões nesta base estendida (ou seja, a NMF é utilizada como um pré-processamento) e depois apresentarmos os dados resultantes à rede neural. A ideia de extrair duas NMF's, uma para o sinal e outra para o background parte do conhecimento de domínio do problema já que sabemos que o perfil energético depositados nos anéis destas duas classes é distinto e, assim sendo, espera-se que a projeção do sinal na base de sinal seja mais forte do que na base do background e vice-versa deste modo melhorando a eficiência de classificação de eventos.

A rede neural utilizada neste trabalho possui uma camada escondida com neurônios com função de ativação do tipo tangente hiperbólica. A camada de saída possui um neurônio também com função de ativação do tipo tangente hiperbólica e a função objetivo é o erro médio quadrático. Para o treinamento da rede neural, foi utilizado um processo de validação cruzada com 10 Folds. Os resultados apresentados foram obtidos utilizando dados de colisão coletados em 2017 pelo ATLAS.

Análise de Dados / 29

Standard Model precision measurements in the ATLAS experiment

Authors: Marco Lisboa Leite¹; Simao Paulo Silva¹; Jose Luis La Rosa Navarro¹

¹ *Universidade de Sao Paulo (BR)*

Corresponding Authors: jose.luis.la.rosa.navarro@cern.ch, marco.leite@cern.ch, simao.paulo.silva@cern.ch

The ATLAS experiment is conducting several high precision measurements in the Standard Model, providing stringent tests of QCD theoretical predictions and constraining the models describing the parton distribution function of the proton. In this talk, we will discuss some measurements of inclusive vector boson production as well as the production of vector bosons associated with heavy flavor jets in the $\sqrt{s} = 13\text{TeV}$ kinematic regime performed by the ATLAS experiment.

Análise de Dados / 30

VBF Higgs Boson Production at CMS

Authors: Andre Sznajder¹; Miqueias Melo De Almeida¹; Luis Junior Sanchez Rosas¹

¹ *Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Authors: andre.sznajder@cern.ch, luis.junior.sanchez.rosas@cern.ch, miqueias.melo.de.almeida@cern.ch

The discovery of the Higgs boson in 2012 provided confirmation of the proposed mechanism of EWSB and also heralded a new era of precision Higgs physics. This CMS analysis presents measurement of the Higgs boson production rate in vector boson fusion(VBF) mode, decaying into $WW \rightarrow 2l2\nu$ and $ZZ \rightarrow 4l$ channels. With gauge boson couplings in both the production and decay vertices, a VBF measurement is a powerful probe of the VVH coupling. In order to improve signal significance we employ a machine learning technique based on deep neural networks for signal and background separation.

Divulgação Científica / 31

Detecting cosmic rays in high schools: an experimental approach for particle physics outreach activities in Sao Paulo

Authors: Marco Lisboa Leite¹; Marisilvia Donadelli¹; Marcelo Gameiro Munhoz¹; Suzana Salem Vazconcelos²; Iva Gurgel²; renan milnitsky²; Guilherme Tomio Saito¹

¹ *Universidade de Sao Paulo (BR)*

² *IFUSP*

Corresponding Authors: marisilvia.donadelli@cern.ch, marco.leite@cern.ch, guilherme.tomio.saito@cern.ch, munhoz@if.usp.br, suzana@if.usp.br, gurgel@if.usp.br, renan.milnitsky@gmail.com

For many years, it is well known that cosmic rays detection can be used as a valuable tool for discussing particle physics with high school students. An example of this is the operation of spark and cloud chambers in science museums, the Quarknet program in the US and, more recently, the Cosmic Pi and Cosmic Watch projects, just to mention a few. In Brazil, despite some proposals in the past, there is no ongoing widespread project to bring the cosmic ray detection topic in outreach activities. In this talk, we will present an initiative being coordinate at the Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo to equip a network of schools with very low-cost cosmic ray detectors whose project was tailored to adapt our schools' resources and fulfill our pedagogical needs.

Instrumentação / 32

Study of the Single Event Effects on ATLAS Liquid Argon Calorimeter Fase-I electronics

Authors: Guilherme Tomio Saito¹; Marco Lisboa Leite¹; Ricardo Menegasso¹; Marcel Keiji Kuriyama¹; Nemitala Added²

¹ *Universidade de Sao Paulo (BR)*

² *IF USP*

Corresponding Authors: marcel.keiji.kuriyama@cern.ch, ricardo.menegasso@cern.ch, nemitala@if.usp.br, guilherme.tomio.saito@cern.ch, marco.leite@cern.ch

The operation of the LHC detectors in the next decades poses many challenges to the performance of the electronic devices for the front-end analog and digital processing systems: very high channel density, high speed, low power consumption and radiation hardness. Besides this, the location of the electronics inside the detector allows only a very limited access for a short period of time every year, making device reliability a fundamental issue. In this work, we investigated the SEE on COTS ADCs candidates for the ATLAS Liquid Argon Calorimeter Phase-I upgrade program using ion beams in the Pelletron accelerator of the Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo and the proposal to also perform these measurements in several COTS amplifiers.

Instrumentação / 33

Trigger de Elétrons do ATLAS em Região de Baixa Energia Usando Redes Neurais

Author: Micael Verissimo De Araujo¹

Co-authors: Joao Victor Da Fonseca Pinto²; Werner Spolidoro Freund²; Jose Seixas²; Marcia Begalli²

¹ *Univ. Federal do Rio de Janeiro (BR)*

² *Federal University of of Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Authors: micael.verissimo.de.araujo@cern.ch, marcia.begalli@cern.ch, seixas@lps.ufrj.br, joao.victor.da.fonseca.pinto@cern.ch, werner.spolidoro.freund@cern.ch

O algoritmo *NeuralRinger* atua no segundo nível de trigger do ATLAS e usa as células do calorímetro eletromagnético e hadrônico para construir anéis concêntricos de deposição de energia em torno da célula de deposição máxima de energia. Este processo preserva as informações lateral e longitudinal da forma do chuveiro e a sua interpretação da física, ao mesmo tempo em que reduz a quantidade de informação, em relação ao uso de todas as células de uma Região de Interesse (ROI). A soma das energias das células que formam cada anel é utilizada em um teste de hipóteses, determinando se o evento deve ser descartado ou não. No ATLAS, a decisão é tomada por uma combinação de redes neurais, atuando em setores determinados pela posição no detector ou pela faixa de energia transversa.

Este trabalho concentra-se na aplicação do *NeuralRinger* para regiões de baixa energia ($E_T < 15 \text{ GeV}$), que é uma proposta alternativa ao método atual (*Cut based*). Para tal, são utilizados elétrons provenientes do decaimento $J/\Psi \rightarrow ee$. A contribuição dos elétrons produzidos pelo decaimento da J/Ψ vem de duas fontes: *prompt production*, quando a J/Ψ é produzida na colisão próton-próton ou nos decaimentos radioativos, ou *non-prompt production*, quando J/Ψ é produzida no decaimento de um quark b . Este trabalho utiliza elétrons de *prompt production* para o treinamento do ensemble de redes neurais. Resultados preliminares serão apresentados utilizando dados de colisão do ATLAS de 2017.

Instrumentação / 34

O laboratório de instrumentação do High Energy Physics and Instrumentation Center na USP

Authors: Marco Bregant¹; Hugo Natal Da Luz²

¹ Universidade de Sao Paulo (BR)

² Universidade de São Paulo (BR)

Corresponding Authors: hugonluz@cern.ch, marco.bregant@cern.ch

Uma das linhas de pesquisa do HEPIC@USP dedica-se ao desenvolvimento de instrumentação para Física de Altas Energias e ao estudo de possíveis aplicações em outras áreas. Essa atividade na instrumentação abrange o estudo de detectores a gás baseados em microestruturas e o desenvolvimento de electrónica dedicada a este tipo de detectores para uso em grandes experimentos. Para além disso, são exploradas aplicações em outras áreas da Física, tais como a imagem de raios X e a detecção de nêutrons.

Na electrónica dedicada, o HEPIC@USP, em parceria com a Escola Politécnica, desenvolveu um ASIC, chamado SAMPA, a ser usado no experimento ALICE para actualizar o sistema de leitura da câmara de projecção temporal (TPC) e do traceador frontal de muons (MCH), de modo a torná-los compatíveis com taxa de eventos aumentada para até 50KHz em colisões PbPb, planejada para o Run 3 do LHC, no CERN. Nesta apresentação será descrita a versão final deste ASIC, que foi extensivamente testado sob a coordenação do nosso grupo, e serão dados alguns detalhes do seu desempenho. Serão também mostrados alguns aspectos da pesquisa realizada em detectores, onde serão mostrados alguns resultados obtidos no estudo da sua Física, os progressos na construção de um sistema de imagem de fluorescência de raios X e as soluções para a detecção de nêutrons com detectores gasosos usando filmes de carbeto de boro enriquecido.

A integração do SAMPA nos detectores em desenvolvimento no HEPIC@USP é um plano para um futuro próximo, e os trabalhos em curso com esse objetivo serão também descritos.

Finalmente serão também mostrados resultados obtidos com microestruturas do tipo Thick-Gas Electron Multiplier desenhadas no nosso grupo e produzidas em São Paulo, com recurso à indústria.

Computação / 35

Avaliação para o Experimento ATLAS de Otimização por Pré-Processamento de Identificação de Elétrons

Author: Guilherme Souza Sobrinho¹

Co-authors: Carlos Eduardo Quesada²; Guilherme Martinelli de Freitas²; Jose Seixas¹; Werner Spolidoro Freund¹

¹ *Federal University of Rio de Janeiro (BR)*

² *UFRJ*

Corresponding Authors: seixas@lps.ufrj.br, guimdefreitas@hotmail.com, werner.spolidoro.freund@cern.ch, guilherme.souza.sobrinho@cern.ch, caduquesada@outlook.com

Durante a Run 2 do LHC, técnicas tradicionais encontraram limitações em manter o nível de exigência para operação. Esse foi o caso dos cortes lineares em grandezas físicas tradicionalmente empregados no trigger de elétrons do ATLAS que, desde 2017, tem seu segundo nível de filtragem totalmente baseado em uma estratégia híbrida multivariável. Como parte da estratégia híbrida, está o algoritmo NeuralRinger, que se baseia somente na informação proveniente do Sistema de Calorimetria do ATLAS por meio de anéis concêntricos de energia a fim de explorar a geometria cônica dos chuveiros. Os anéis alimentam um ensemble de redes neurais do tipo Multilayer Perceptron (MLP), com uma camada escondida e totalmente conectada.

Este trabalho estuda o aprimoramento do NeuralRinger para a atuação na seleção offline de elétrons por meio de aplicação de pré-processamento nos anéis. Avaliam-se uma estratégia de pré-processamento estatístico mediante a Análise de Componentes Independentes (ICA) e outra por conhecimento especialista por intermédio do algoritmo Ringer-Rp.

O método ICA busca as fontes geradoras dos anéis de energia, pela suposição que o chuveiro tem um número menor de fontes independentes do que o número de anéis emprega-se a Análise de Componentes Principais (PCA) como método para redução da dimensionalidade. A extração das fontes geradoras é realizada tanto para o caso concatenado, onde se empregam todas as amostragens longitudinais na extração, e segmentado, onde a extração é realizada para cada amostragem.

No método Ringer-Rp, realiza uma ponderação não-linear dos anéis em função de sua energia e distância ao baricentro em função de dois respectivos parâmetros: α e β . Neste trabalho, avalia-se a otimização desses parâmetros por uma busca em grade.

Avalia-se a performance nos dados de colisão obtidos durante 2016 e contendo decaimentos $Z \rightarrow ee$ e seu respectivo ruído de fundo.

Análise de Dados / 37

Studies of central diffractive production of open charm with CMS and TOTEM experiments.

Authors: Eduardo Alves Coelho¹; Helio Nogima¹; Wagner De Paula Carvalho¹

¹ *Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Authors: helio.nogima@cern.ch, eduardo.alves.coelho@cern.ch, wagner.de.paula.carvalho@cern.ch

The CMS and TOTEM experiments have jointly collected data from pp collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV in a special LHC run at the end of 2015. We discuss a preliminary analysis concerning the possibility of observation of diffractive open charm mesons in the channels $D^{+*} \rightarrow D^0 + \pi^+ \rightarrow K^+ + \pi^- + \pi^+$ (c.c) and $D^0 \rightarrow K^+ + \pi^-$ (c.c) taking advantage of TOTEM's proton tagging capability. The analysis is based on the reconstruction of the D^0 and D^+ in the central detector (CMS), combined with the proton reconstructed by the forward detector (TOTEM), in order to select central diffractive events. The results are compared with a Monte Carlo simulation that reproduces the conditions the data were collected.

Instrumentação / 38

Redes Neurais Especialistas para Fusão de Múltiplas Representações de Informação

Author: Matheus Rebello do Nascimento^{None}

Co-authors: Marcia Begalli¹; Werner Spolidoro Freund¹; Jose Seixas¹

¹ *Federal University of of Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Authors: werner.spolidoro.freund@cern.ch, seixas@lps.ufrj.br, marcia.begalli@cern.ch

O gradativo aumento de luminosidade no LHC tem exigido métodos mais eficientes para a manutenção da capacidade de seleção on-line e off-line. Nesse sentido, o ATLAS adotou o algoritmo NeuralRinger, que possibilitou aliviar a demanda por processamento durante a filtragem online a partir de 2017. Essa estratégia, dedicada à seleção de elétrons, emprega outra representação da informação de calorimetria, baseada em 100 anéis concêntricos ao baricentro de energia que é aproximado, na filtragem online, pela célula mais energética. A tomada de decisão emprega uma assembleia de redes neurais específicas por regiões de energia e posição da partícula incidente na região de precisão do experimento, o que possibilita limitar o impacto da resposta do detector no perfil dos anéis.

Este trabalho avalia a atuação do NeuralRinger para a seleção offline de elétrons no experimento ATLAS. A fim de estender o método para atingir sua eficiência máxima nesse ambiente, avalia-se a adição da informação discriminante disponível que incluem a representação tradicional em 13 grandezas físicas provenientes do traço da partícula e de calorimetria. Com isso, a estratégia proposta para a atuação offline contará com três representações de informação: os anéis de energia e as grandezas físicas unicamente provenientes de calorimetria; e as grandezas físicas construídas com informação tanto de traço quanto calorimetria. A fim de realizar a tomada de decisão, ajustam-se, para cada região de energia e posição da partícula, redes neurais especialistas para cada representação da informação que, posteriormente, alimentam através dos neurônios da camada escondida a entrada de outra rede neural responsável pela fusão da informação. Desta forma, espera-se que a estratégia possa complementar eventuais lacunas ao apresentar ambas as representações e aumentar a concordância da estratégia proposta com a referência utilizada na tomada de decisão off-line baseada em verossimilhança, que utiliza as grandezas tradicionais.

Comparou-se a proposta de extensão do NeuralRinger com a referência em atuação nesse ambiente, baseada em verossimilhança nas grandezas tradicionais, em dados de simulação com condições equivalentes as colisões de próton-próton de 2016. Observou-se uma redução na taxa de falsos elétrons de 2,54 para 1,13 em valor central e com incerteza de validação cruzada desprezível quando a proposta atua com toda as representações de informação disponíveis.

Instrumentação / 39

Intervenções Baseadas em Calorimetria Para o Sistema de Filtragem Online de Elétrons e Múons do ATLAS Durante a Run 2

Authors: Joao Victor Da Fonseca Pinto¹; Micael Veríssimo de Araújo^{None}

¹ *Federal University of of Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Author: joao.victor.da.fonseca.pinto@cern.ch

Durante a operação da Run 2, o ATLAS previu a necessidade de uma grande melhoria de seu trigger para a operação no ano de 2017. Esse trabalho irá descrever as intervenções realizadas para a filtragem de elétrons e múons para conter o aumento de eventos processados ao longo de sua cadeia de filtragem e manter a eficiência de detecção apesar do aumento de empilhamento.

A intervenção no trigger de elétron atuou no estágio inicial do HLT, realizado apenas com informação de calorimetria. A extração da informação do chuveiro é realizada através de soma em anéis concêntricos de energia ao baricentro, aproximado pela célula mais energética. Essa abordagem permite explorar o desenvolvimento aproximadamente cônico do chuveiro enquanto fornecer compressão

da informação quando em relação a representação no nível de células. Para a tomada de decisão, emprega-se um ensemble de redes neurais específicos por regiões de energia e posição de incidência da partícula, o que permite aliviar distorções causadas por essas variáveis na representação dos anéis, alimentados as redes. No caso do trigger de múons, a intervenção atingiu o primeiro nível de filtragem, contando com uma implementação de hardware específico para a fusão da informação de calorimetria com os traços obtidos no Espectrômetro de Múons. Para tomada de decisão, cortes em energia são aplicados de forma a eliminar falsos múons e reduzir, assim, o processamento no segundo nível.

Os resultados mostram que a intervenção no trigger de elétrons operou com eficiência praticamente inalterada em relação ao método anterior, porém forneceu uma redução de processamento em 25% na parcela dedicada a coleta de elétrons e fótons, enquanto uma redução de 200 ms para 100 ms na latência da cadeia principal de menor energia para a coleta de elétrons. Para o primeiro nível de filtragem de múons a estratégia combinando as informações do calorímetro e o espectrômetro de múons obteve uma redução no nível de processamento em 10% para a mesma eficiência de detecção no final do sistema de filtragem.

Instrumentação / 41

Status of the Neutrinos Angra Experiment

Authors: Luis Fernando Gomez Gonzalez¹; Ernesto Kemp²; Joao Anjos³; Herman Pessoa Lima Junior⁴; Geraldo Carvalho Cernicchiaro⁵; César Castromonte^{None}; Stefan Wagner^{None}; Iuri Pepe⁶; D. B. Ribeiro⁶; Paulo César Farias⁶; Eduardo Simas⁶; Leandro do Rozário Teixeira⁶; José Alejandro Alfonzo Moreno⁶; João Marcelo Silva Souza⁶; Germano Guedes⁷; Pietro Chimenti^{None}; Rafael Antunes Nobrega⁸; Igor Costa⁹; David Souza⁹; Marcelo Paschoal Dias⁹; Guilherme Lopes⁹

¹ IFGW - Unicamp

² University of Campinas

³ Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas

⁴ CBPF

⁵ Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas (CBPF)

⁶ Federal University of Bahia

⁷ State University of Feira de Santana

⁸ Juiz de Fora Federal University (BR)

⁹ Federal University of Juiz de Fora

Corresponding Authors: pietro.chimenti@gmail.com, janjos@cbpf.br, geraldo@cbpf.br, rafael.nobrega@ufjf.edu.br, lfgomez@ifi.unicamp.br, herman.lima.junior@cern.ch, kemp@ifi.unicamp.br

The Neutrinos Angra Project has a compact surface antineutrino detector operating aside the Angra II reactor, inside the Angra dos Reis nuclear power plant (Rio de Janeiro, Brazil). The detector transport and assemble in the power plant laboratory happened in the first months of this year and the commissioning of the detector and all support systems is happening during the first semester of 2018. The main purpose of this experiment is to monitor the reactor thermal power using only the measured reactor antineutrinos flux as input. As a surface detector, the main challenge of this experiment is to deal with a huge background and still obtain a good signal to noise separation, using carefully chosen data analysis techniques. In this work we will present the status and last results of the Neutrinos Angra Project.

Análise de Dados / 42

Search for Long-Lived Gluinos in Compressed SUSY Scenarios

Authors: Carsten Hensel¹; Helena Brandao Malbouisson²; Gilson Correia Silva¹; Fabio Lucio Lucio Alves¹; Gilvan Augusto Alves¹; Matthias Hamer³; Sheila Silva Do Amaral²

¹ CBPF - Brazilian Center for Physics Research (BR)

² Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)

³ University of Bonn (DE)

Corresponding Authors: carsten.hensel@cern.ch, helena.malbouisson@cern.ch, gilson.correia.silva@cern.ch, fabio.lucio@cern.ch, sheila.mara.do.amaral@cern.ch, gilvan.augusto.alves@cern.ch, matthias.hamer@cern.ch

This analysis is set in the context of the Supersymmetric Compressed Scenarios, characterized by a very high compression in the mass spectrum of the gauginos and higgsinos below the TeV scale, while the scalar superpartners are out of reach of the LHC experiment. We use CMS Run II data with a center-of-mass energy of $\sqrt{s} = 13$ TeV to perform a search on a promising channel characterized by the production of two gluinos, each one decaying into a quark, anti-quark and neutralino 1. The signal leads to a hard to detect signature, characterized by the presence of a moderate missing transverse energy (E_T^{miss}), secondary vertices and low energy jets. We thus require a hard jet from initial state radiation to 'tag' the event. We use a E_T^{miss} trigger to select the events, which allows us to typically select signal events that have at least one jet from the initial state radiation. In addition, we use information from jets and vertices (primary and secondary) reconstructed by the CMS to select events with sufficient information to identify the decay of at least one of the gluinos.

Análise de Dados / 43

Prospects on semileptonic WW CEP in aQGC scenarios at CMS

Author: Mauricio Thiel¹

Co-authors: Luiz Martins Mundim Filho¹; Clemencia Mora Herrera¹

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (BR)

Corresponding Authors: clemencia.mora.herrera@cern.ch, luiz.mundim@cern.ch, mauricio.thiel@cern.ch

One of the most important approaches to the possibility of new physics Beyond the Standard Model is the use of Effective Field Theory (EFT) to describe higher energy theoretical models at lower energies, like that of the LHC. In this type of scenario, it is possible to have additional couplings to describe gauge bosons self-interactions, such as anomalous Triple (aTGC) and Quartic Gauge Couplings (aQGC). These anomalous gauge couplings can appear, for example, as an excess in the $\gamma\gamma \rightarrow WW$ process.

The CMS subdetector PPS (Precision Proton Spectrometer) consists of detector stations at ~ 200 m on both sides of the interaction point, allowing to detect protons that remained intact after losing a fraction of their energy in the interaction, that measure the proton's position and the time-of-flight. PPS is an extremely important tool to investigate Central Exclusive Production (CEP) with high levels of pileup collisions. In CEP processes, we have $p + p \rightarrow p \oplus X \oplus p$, where \oplus means rapidity gaps, X is the central final state (that could be WW , ZZ , di-jets...) and we also have two protons in the final state.

A prospect on the CEP of WW for LHC RUN II will be presented, considering aQGC in the EFT dimension-6 scenario. The chosen channel is the semileptonic one, which is characterized by the presence of a muon, missing transverse energy, and a single large jet in the central CMS detector; and two scattered protons tagged by PPS in the final state. The signal samples are generated by the FPMC generator.

Análise de Dados / 44

Medições de quarks pesados do HEPIC@IFUSP no experimento ALICE

Author: Henrique Jose Correia Zanolli¹

¹ *Universidade de Sao Paulo (BR)*

Corresponding Authors: camila.de.conti@cern.ch, h.zanolli@cern.ch

Quarks pesados (charm e beauty) são produzidos nos estágios iniciais das colisões devido às suas massas grandes. Isso permite que eles sofram efeitos da evolução completa do sistema, interagindo com o Plasma Quark-Gluon (QGP) criado em colisões de íons pesados (Pb-Pb) de alta energia. Em colisões de p-Pb, os efeitos da matéria nuclear fria (cold nuclear matter) podem modificar a produção dos quarks pesados. O estudo desse sistema serve como medida de referência para as medições de Pb-Pb, contribuindo para o entendimento de propriedades QGP. Colisões entre prótons são também usadas como referência para os estudos em Pb-Pb e teste de cálculos de QGP perturbativa. No LHC, medidas em colisões pp e p-Pb de alta multiplicidade obtiveram resultados inesperados para quarks leves, como a presença de fluxo elíptico e o aumento da estranheza, tornando estes sistemas ainda mais interessantes para a física nuclear de altas energias. Nessa apresentação serão apresentados os resultados mais recentes das análises do grupo HEPIC@IFUSP, parte do experimento ALICE. O grupo contribui com estudos sobre quarks pesados em colisões pp, p-Pb e Pb-Pb.

Instrumentação / 45

Desenvolvimentos, construção, instalação e operação de RPC para a próxima geração de experimentos de astropartículas

Author: Carola Dobrigkeit Chinellato¹

¹ *Universidade Estadual de Campinas*

Corresponding Author: carola@ifi.unicamp.br

Presentemente, estamos montando no IFSC câmaras de placas resistivas (RPC) para serem testadas e utilizadas no Observatório Pierre Auger para medir o sinal de múons de chuveis atmosféricos. Apresentaremos os progressos já alcançados na montagem e operação das RPC e os planos para a sua instalação no Observatório a fim de testar seu funcionamento no sítio sob condições ambientais reais de operação. O objetivo é alcançar a calibração entre si das RPC e dos novos detectores instalados junto aos detectores de água-Cherenkov operando no Observatório, a saber, dos cintiladores e detectores subterrâneos de múons.

Divulgação Científica / 46

Particle Physics Outreach Activities at IFUSP: dialogues with the schools

Authors: Graciella Watanabe¹; Iva Gurgel²; Marcelo Gameiro Munhoz³

¹ *Universidade Federal do ABC*

² *IFUSP*

³ *Universidade de Sao Paulo (BR)*

Corresponding Authors: graciella.watanabe@cern.ch, munhoz@if.usp.br, gurgel@if.usp.br

The High Energy Physics Instrumentation Center (HEPIC) of Physics Institute of University of São Paulo (USP) has produced - in recent years - different outreach activities, focusing to promote a dialogue between scientists and school actors (teachers and students). These actions generated different publications and educational proposals to teach particle physics - specially high energy physics - to students and teachers of the public schools of São Paulo. According to debates produced by authors like Levy-Léblond (2004) and Klein (2013), it is important to reduce the gap between physicists and society, in order to improve the scientific culture of students. The purpose of this presentation is to analyze the Masterclasses Hand On Particles Physics - CERN - ALICE and a teacher training course developed in this context. The results obtained indicate that an important aspect of Nature of Science promoted in these activities is the understand of science as a knowledge produced by a community. In particular, the role of cultural acquisition of these interactions is recognized as a determining factor for overcoming the stereotypes of scientists and the recognition of national science (Watanabe, 2015).

Lévy-Leblond, J. M. (2004). Science in want of culture. France: Futuribles.

Klein, E. (2013). Comment dire avec des mots ce don't parle physique? In M. F. Chevallier; J. M. Dabadie (orgs.). Partager la science (pp 97-119). France: Actes Sud.

Watanabe, G. (2015). A divulgação científica produzida por cientistas: contribuições para o capital cultural. (Tese de Doutorado em Ensino de Física), Instituto de Física, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Computação / 47

O uso de HPCs pelo LHCb/CERN

Author: Renato Santana¹

¹ *Centro Bras. de Pesquisas Físicas (CBPF)-Unknown-Unknown*

Corresponding Author: rsantana@cbpf.br

O CERN(Centro Europeu de Pesquisas Nucleares) tem usado, nos últimos anos, o grid computacional como fonte de recursos de processamento e armazenamento de dados. Um recurso no grid computacional pode ser, desde um PC (Personal Computer), até um “grande” computador, como um HPC(High Performance Computer).

Há ainda uma grande demanda por processamento dos dados gerados pelo LHC(Large Hardron Collider) e na geração de simulações (Monte Carlo) com objetivo de se validar modelos probabilísticos. Neste sentido, alguns centros de pesquisas, dentro da colaboração com o CERN, tem colocado “à disposição” da grid seus HPCs para tal processamento.

Apesar da altíssima capacidade de processamento dos HPCs, há de se “preparar” tais máquinas para receber e enviar jobs e dados.

O presente trabalho apresenta um estudo de caso no uso de HPCs por um dos experimentos do CERN, o LHCb (Lage Hardron Collider Beauty). Inicialmente, apresentam-se os requisitos necessários para a integração de um HPC ao LHCb. Posteriormente, apresentam-se alguns exemplos de uso de HPCs pelo LHCb. Finalmente, mostra-se a experiência vivida na preparação da maior máquina da América Latina, o Santos Dumont (do LNCC - Laboratório Nacional de Computação Científica), no sentido de ser usada pelo LHCb.

Análise de Dados / 48

Physics with jets at LHCb

Author: Murilo Santana Rangel¹

¹ *Federal University of of Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Author: murilo.rangel@cern.ch

LHCb, while purpose built for b-physics, also functions as a general purpose forward detector, covering the pseudo-rapidity range 2.0 to 5.0. A wide variety of forward production measurements, used to constrain the proton PDFs, have been performed using the datasets collected in Runs 1 and 2 of the LHC. These include measurements of jet production which will be presented, highlighting the scope and sensitivity of the LHCb physics programme.

Análise de Dados / 49

Central exclusive production at LHCb

Author: Murilo Santana Rangel¹

¹ *Federal University of Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Author: murilo.rangel@cern.ch

The installation of scintillating pad detectors (Herschel), bracketing the LHCb detector along the beamline, have significantly enhanced LHCb's sensitivity to central exclusive production. Additionally, dedicated triggers during the early measurement period of Run 2 have produced an extended CEP dataset. A summary of results from Run 1 as well as early results from Run 2 will be shown.

Análise de Dados / 50

Física do charm no LHCb

Author: Alberto Correa Dos Reis¹

¹ *CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)*

Corresponding Author: alberto@cbpf.br

O grupo de Física do Charm do LHCb-Rio, formado em 2008 por pesquisadores da PUC, UFRJ e CBPF, tem como linhas de pesquisa o estudo da violação de CP e de interações hadrônicas a baixas energias, usando para tal os decaimentos de mésons D⁺ e D_s⁺ em três mésons leves carregados. Apresentamos os resultados já obtidos pelo grupo bem como os estudos em andamento e projetos futuros.

Análise de Dados / 51

Charge-Parity asymmetry in B mesons decays to three-body charmless final states at LHCb experiment

Author: Fernando Luiz Ferreira Rodrigues¹

¹ *CBPF - Brazilian Center for Physics Research (BR)*

Corresponding Author: frodrigu@cbpf.br

O decaimento do méson B carregado em três hádrons (píons ou káons) no estado final oferece um ótimo ambiente para o estudo do fenômeno de violação da simetria de Carga-Paridade (ACP). Além de prover informações para uma melhor compreensão da dinâmica dos decaimentos hadrônicos do méson B. Dentro deste contexto, a apresentação irá focar nos decaimentos $B^\pm \rightarrow K^\pm \pi^+ \pi^-$, $B^\pm \rightarrow K^\pm K^+ K^-$, $B^\pm \rightarrow \pi^\pm \pi^+ \pi^-$ e $B^\pm \rightarrow \pi^\pm K^+ K^-$.

Medidas de ACP global publicadas pela colaboração [Phys. Rev. D90, 112004 (2014)] com os dados adquiridos nos anos de 2011 e 2012, apresentaram a primeira evidência de violação de CP nestes canais. Além de regiões bem localizadas no espaço de fase desses decaimentos, em que a assimetria se mostrou muito maior. Atualmente, além de realizar um upgrade nestas medidas com os dados adquiridos em 2015 e 2016, uma análise de amplitudes dos espaços de fase desses decaimentos vem sendo realizada. Uma forte colaboração para desenvolver a teoria por trás desses resultados vem se mostrando necessária.

Divulgação Científica / 52

Decobrando a Física de Partículas

Author: Murilo Santana Rangel¹

¹ *Federal University of Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Author: murilo.rangel@cern.ch

O projeto de extensão propõe a divulgação da Física de partículas de forma interativa para alunos de diversos graus de escolaridade, tendo como base o projeto intitulado International Masterclasses Hands on Particle Physics. O Internacional Masterclasses é realizado uma vez por ano organizado por diversas instituições com apoio do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN). Mais de 10.000 alunos de ensino médio, de 47 países, participam dessas atividades. A UFRJ é uma das instituições integrantes desse projeto, sendo a organização local feita por professores do Laboratório de Física de Partículas Elementares (LAPE), os quais são membros de um experimento localizado no CERN. Uma palestra inicial é realizada, onde o assunto é levado até o público alvo para enriquecimento do conteúdo, ou primeiro contato. Em seguida, os alunos realizam atividades interativas no computador, com o objetivo de se familiarizar com a Física de partículas, tornando possível uma compreensão do que foi apresentado na palestra. Finalmente, uma videoconferência é realizada com pesquisadores do CERN e outros grupos participantes de diferentes países, com o propósito de debater os resultados, somar conhecimentos, levantar questionamentos e tirar dúvidas.

O principal objetivo é atrair estudantes para cursar Física e áreas afins, com ênfase para a Física de partículas. Além de desconstruir a ideia de que essas áreas são restritas, também temos como meta divulgar e alfabetizar os alunos nesse tema.

Divulgação Científica / 53

Discussão sobre a participação brasileira no IPPOG

Author: Marcelo Gameiro Munhoz¹

¹ *Universidade de Sao Paulo (BR)*

Corresponding Author: munhoz@if.usp.br

Nesta apresentação, farei um breve resumo sobre o IPPOG e a participação brasileira nesse grupo internacional, estimulando a discussão sobre novos projetos e ideias que possam estimular e motivar o desenvolvimento de atividades de divulgação e ensino da física de partículas no país.

Divulgação Científica / 54**Escola de Física CERN****Authors:** Nelson Barrelo Jr.¹; Nilson Marcos Dias Garcia²¹ UFF² UFPR

A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) mantém o programa “Escola de Professores no CERN em Língua Portuguesa”, destinado a professores de escolas de ensino médio dos seus diversos países membros. Durante estes eventos são desenvolvidas aulas sobre Física de Partículas e áreas associadas, sessões experimentais e visitas aos laboratórios do CERN.

Em 2009, como uma ampliação da cooperação do CERN com o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP), de Portugal, e resultado de negociações com pesquisadores brasileiros do CBPF e integrantes da diretoria da Sociedade Brasileira de Física, através de sua Secretaria para Assuntos de Ensino, foi aberta a possibilidade de participação de professores brasileiros no programa que, no Brasil, assumiu o nome de Escola de Física CERN.

Desde então, e até o ano de 2017, a organização da participação dos professores brasileiros foi realizada pela Sociedade Brasileira de Física (SBF). A partir deste ano o evento passa a ser organizado pelo São Paulo Research and Analysis Center (SPRACE), em parceria com o Instituto Principia, a Sociedade Brasileira de Física e a Rede Nacional de Física de Altas Energias (RENAFAE).

É relevante salientar que tal Programa promove a inserção de Física Moderna e Contemporânea nos currículos escolares e possibilita o aprofundamento e o desenvolvimento profissional de professores de todas as regiões brasileiras, tendo, ao longo dos anos contemplado docentes de quase todas as Unidades da Federação

Neste ano, acontecerá no período de 2 a 8 de setembro, ao lado de professores do Ensino Médio portugueses e africanos. Além da participação na Escola de Professores no CERN em Língua Portuguesa, em Genebra, os professores brasileiros também participarão de palestra e visita ao LIP, em Lisboa, entre os dias 29 de agosto e 01 de setembro, preparando-se para a Escola e de visita aos Museu e Casa do Einstein, em Berna, no dia 09 de setembro.

Divulgação Científica / 55**O IPPOG Masterclasses, e a Divulgação Científica, promovidos pela UERJ, COPPE-UFRJ, UFLA, UFRN, IFRN e IFCE****Author:** Marcia Begalli¹¹ *Federal University of Rio de Janeiro (BR)***Corresponding Author:** marcia.begalli@cern.ch

O IPPOG Masterclasses - Hands on Particle Physics é a atividade de Divulgação Científica que leva seus participante, alunos e professores do Ensino Médio, e alunos de graduação, a vivenciarem o trabalho em Física de Altas Energias, mesmo que por um curto período de tempo. Ele vem sendo realizado no Brasil desde 2008, na UERJ, no Rio de Janeiro, bem como no SPRACE/UNESP, em São Paulo. Aos poucos, outras universidades e institutos federais se uniram a essa atividade, auxiliando na expansão do IPPOG Masterclasses em outros estados brasileiros.

Aliadas ao IPPOG Masterclasses estão as visitas virtuais aos experimentos ATLAS e CMS, onde os alunos e professores do Ensino Médio podem visitar, virtualmente, a sala de controle dos experimentos, quando possível ver os detectores que compõe os experimentos, ou ao menos alguns dos módulos que formam tais detectores. Além disso, conversam e elaboram perguntas com um (ou mais) membro do experimento, em português, permitindo assim um contato com um profissional presente no CERN, aguçando a curiosidade dos jovens sobre ciência e ser cientista.

Em Fortaleza, o IPPOG Masterclasses integra o evento bianual “From Micro to Macrocosmos” realizado pelo grupo GEPAC. Este grupo realiza diversas atividades de pesquisa em ensino e divulgação em Astrofísica, Cosmologia e áreas afins.

A LISHEP, a escola internacional de Física de Altas Energias que possui uma sessão dedicada a professores do Ensino Médio e alunos de graduação, realizada majoritariamente no Rio de Janeiro, mas também com edições em Manaus e Salvador, já teve entre suas atividades o IPPOG Masterclasses.

Apresentaremos um breve resumo das atividades de divulgação científica em Física de Altas Energias que vem sendo realizadas na UERJ (Rio de Janeiro e Nova Friburgo), na COPPE-UFRJ, pelo grupo do experimento ATLAS, na UFRN e no IFRN (Natal), na UFLA (Lavras) e no IFCE (Fortaleza), englobando o IPPOG Masterclasses, as visitas virtuais, a LISHEP e o From Micro to Macrocosmos.

Análise de Dados / 56

b- and c-Jet Energy Corrections in the Higgs Decay

Author: Yara Do Amaral Coutinho¹

¹ *Federal University of Rio de Janeiro (BR)*

Corresponding Author: yara.amaral.coutinho@cern.ch

The proton-proton collisions, at the Large Hadron Collider (LHC), are confirming properties of the Higgs Boson predicted by Standard Model (SM) and providing tools for observation of all Higgs decay channels. The dibosonic decays, despite their low branching ratios, are well understood and have lead the Higgs discovery. In the Run 2 conditions many results have shown considerable agreement between the SM predictions and the experimental data. The measurement and observation of the Higgs decay in a b-quarks pair (branching ratio $\approx 58\%$) is crucial to constrain the overall decay width of SM Higgs and establish coupling with fermions.

Due to the QCD colour-confinement, the quarks and gluons are not observed directly, but the jet energy associated to them can be measured. The energy reconstruction and identification of b-jets in ATLAS has a crucial role to search the Higgs Boson by SM and in scenarios with new physics contributions.

At the LHC the large backgrounds arising from multi-jet production make an inclusive search for $H \rightarrow b\bar{b}/c\bar{c}$ decays extremely challenging. The most sensitive production modes for probing $H \rightarrow b\bar{b}/c\bar{c}$ decays are those where the Higgs boson is produced in association with a W or Z boson, because their leptonic decay modes lead to clean signatures that can be efficiently triggered on, while rejecting most of the multi-jet backgrounds.

For the studies of the SM Higgs, the ATLAS collaboration applies decoupled b- and c-jet energy corrections to improve the Higgs mass resolution, the signal sensitivity and significance.

Análise de Dados / 57

A multivariate selection of charmless B+ decays to three mesons in LHCb detector

Author: José Helder Lopes¹

¹ *UFRJ*

The analysis of charmless decays $B^\pm \rightarrow h_1^\pm h_2^+ h_3^-$, where h_i are pions or kaons, collected by LHCb in Run I, show strong evidence for CP asymmetries in the three-body phase space. We are now analyzing data collected in Run II (2015+2016) and will combine the results with the ones from Run I. After a loose pre-selection, we use a multivariate method (MVA) to improve the signal significance. We show here the comparison of results with

different inputs and different MVA methods, particularly boosted decision trees (BDT) and artificial neural networks (MLP). Our final choice, for the good performance and simplicity, is BDT with a reduced set of input variables, as compared to Run I selection.

Análise de Dados / 58

Estudo do novo código de evolução hidrodinâmica aplicado em colisões de íons pesados

Author: Tiago Jose Nunes da Silva¹

¹ *Universidade Estadual de Campinas*

Corresponding Author: tiagoj.nunes@gmail.com

A evolução da matéria nuclear fortemente interagente resultante de colisões nucleares de íons pesados em energias relativísticas é descrita em uma sequência de etapas. Uma importante etapa é a descrição da matéria através de hidrodinâmica relativística dissipativa, que parece ser válida no intervalo de tempo compreendido entre cerca de 1fm/c a 10 fm/c após a colisão. O código MUSIC, capaz de efetuar a simulação de hidrodinâmica relativística dissipativa em 3+1 dimensões, incluindo correções de viscosidade shear e bulk em segunda ordem, é o estado da arte da modelagem numérica dessa etapa da evolução do sistema.

Desenvolvemos uma suíte de códigos capaz de integrar as várias etapas das simulações de colisões de íons pesados relativísticos, incluindo a geração de condições iniciais através do modelo TRENT0, a evolução hidrodinâmica através do software MUSIC, o processo de particlização do sistema utilizando um sampler e a subsequente evolução do sistema hadrônico resultante através do UrQMD. Realizamos um estudo da sensibilidade dos observáveis finais aos diferentes processos físicos implementados numericamente e efetuamos uma comparação direta a dados experimentais.

Análise de Dados / 59

Color reconnection effects on resonance production

Author: David Dobrigkeit Chinellato¹

¹ *University of Campinas UNICAMP (BR)*

Corresponding Author: david.dobrigkeit.chinellato@cern.ch

Recent studies of high-multiplicity proton-proton (pp) collisions at the LHC have shown that, in these systems, relative resonance production is reduced with respect to minimum-bias interactions. In this work, we present a phenomenological study that shows how multi-parton interactions and color reconnection (CR) affect resonance yields in the PYTHIA8 event generator. It is observed that CR leads to a systematic decrease of relative resonance yields, reducing integrated yield ratios such as K^*/K and ρ^0/π in high-multiplicity pp collisions. In-depth studies indicate that the underlying mechanism causing this effect is that CR leads to shorter, less energetic strings whose fragmentation is less likely to produce more massive hadrons for a given quark content. These observations suggest an alternate explanation for resonance suppression, which is usually explained as being a consequence of the rescattering of resonance decay daughters in a high-density hadronic medium. Based on Phys. Rev. D 97, 036010 (2018).

Análise de Dados / 60

Search for Diboson Resonances with the CMS experiment

Authors: Sudha Ahuja¹; Thiago Tomei Fernandez¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista (BR)

Corresponding Authors: thiago.tomei@cern.ch, sudha.ahuja@cern.ch

The São Paulo Research and Analysis Center (SPRACE) is actively working on the analyses of the data collected by CMS. One of our main interest is the search for physics beyond standard model. In this talk we will show the efforts of the SPRACE group on the search for new diboson resonances at the CMS experiment.

With the discovery of the H boson by ATLAS and CMS collaborations in 2012, science has started to shed light on the breaking of the electroweak symmetry. If the EWSB has a more complex cause than the Brout-Englert-Higgs mechanism present in the standard model, it stands to reason that new phenomena would appear in the production of weak bosons. A particularly enticing scenario is the possibility of new resonances decaying to pairs of W, Z and H bosons. We will present our efforts on the search for these diboson resonances, including results from our latest paper with 2016 pp collisions data.

Análise de Dados / 61

Search for Dark Matter with the CMS experiment

Authors: Thiago Tomei Fernandez¹; Pedro Galli Mercadante¹; Sudha Ahuja¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista (BR)

Corresponding Authors: sudha.ahuja@cern.ch, thiago.tomei@cern.ch, pedro.mercadante@cern.ch

The São Paulo Research and Analysis Center (SPRACE) is actively working on the analyses of the data collected by CMS. One of our main interest is the search for physics beyond standard model. In this talk we will show the efforts of the SPRACE group on the search for Dark Matter particles at the CMS experiment.

Experimental evidences of the existence of Dark Matter have come only from gravitational effects. Many theoretical proposals to explain its composition involve extensions of the standard model that predict the existence of new particles. However, the Dark Matter experimental evidences does not lead necessary to signals at the LHC which makes the search very intricate. We will present the CMS efforts on the search for Dark Matter, especially on the monojet channel.

Análise de Dados / 62

MIPWA usando GooFit

Authors: Alberto Correa Dos Reis¹; Juan Baptista Leite²

¹ CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)

² CBPF - Brazilian Center for Physics Research (BR)

Corresponding Authors: alberto@cbpf.br, juan.baptista.leite@cern.ch

O GooFit, um framework para realizar ajustes pelo método de máxima verossimilhança utilizando GPUs, nos permite determinar amplitudes em decaimentos de três corpos, como o $D_{s^+} \rightarrow \pi^- \pi^+ \pi^+$, independentemente de modelos. A amplitude a ser determinada é representada por uma função

complexa genérica, definida em pontos fixos no espectro de massa invariante por pares de números reais, que são os parâmetros do ajuste. O valor da amplitude em qualquer ponto do espectro é determinado por interpolação via spline cúbica. Esse método de análise é chamado de MIPWA - Model Independent Partial Wave Analysis.

O método é validado com simulações usando o modelo isobárico –soma coerente de amplitudes dependentes do spin. Conhecendo a priori a forma funcional da amplitude a ser determinada, a amostra simulada é ajustada pelo método MIPWA. O resultado do ajuste é comparado à forma funcional utilizada na simulação. Uma comparação entre o desempenho do algoritmo de ajuste realizados por GPUs e CPUs é apresentada.

Instrumentação / 63

Implementation of an IPMC and Linux box over Xilinx Zynq MP-SoC for ATCA blades of the Backend Hardware Platform Prototype

Author: Lucas Arruda Ramalho¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista (BR)

Corresponding Author: lucasarrudaramalho@gmail.com

The CMS Phase 2 upgrade is developing a new backend system for the Tracker subdetector. The goal is to propose a generic ATCA hardware platform for three different purposes.

First, the Inner Tracker (IT) Data Trigger and Control (DTC) - that will be responsible to receive, format and organize the data coming from the Pixel Detector. It will be an interface between the Inner Tracker and the Data Acquisition (DAQ) system. Second, the Outer Tracker (OT) DTC - that will be responsible to receive, format and organize the data coming from the Strip Detector. It will be an interface between the Outer Tracker, the L1 Tracking Trigger (L1TT) system and the DAQ system. Finally, the L1TT system - that will be responsible to receive the pre-trigger data from the OT-DTC, to perform a pattern recognition algorithm, to find tracks with energy greater than 2 GeV and to discard the low energy tracks. The IT-DTC and OT-DTC systems have massive communication requirements. In other hand, the L1TT system has massive processing requirements. Thus, is a challenge to build a hardware platform that could give support for those different systems.

The KIT institute is prototyping an ATCA hardware platform based on having a generic motherboard that support customization with daughter FPGAs connected through interposers. The control and management are centralized in a Multiprocessor System-on-Chip (MPSoC) Zynq Ultrascale + (US+) device. The Zynq device will concentrated two main tasks. First, FPGA remote programming and debugging services, like IPbus, AXI Chip-to-Chip (C2C), SPI, JTAG, among other services. The environment will be based on a Linux box implemented over the Application Processing Unit from Zynq. And second, the communication between the ATCA blade and the Shelf manager using IPMI protocol. The IPMC functionality, implemented over a FreeRTOS in the Real-Time Processing Unit, will run the ATCA requirements for the communication and will perform the sensor monitoring.

The KIT approach is a centralized slow control and board management solution for the backend system hardware platform. The advantage is to reduce board complexity, to save investments and to optimize power payload usage.

Instrumentação / 64

Electronics development for the upgrade of the CMS tracker

Authors: Vitor Finotti¹; Andre Muller Cascadan¹; Luigi Calligaris¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista (BR)

Corresponding Authors: luigi.calligaris@cern.ch, vfinotti@ncc.unesp.br, cascadan@ncc.unesp.br

In 2024 the Large Hadron Collider will enter a long shutdown to allow its upgrade (High-Luminosity LHC), such that it will later be able to run in a maximum instantaneous luminosity of 5 to 7×10^{34} $\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$.

While this represents an increase in the rate of interesting data generated at the LHC experiments, the resulting increase in the number of pile-up interactions and radiation will require significant upgrades to the CMS experiment, including a complete replacement of the inner and outer silicon trackers. The new outer tracker will reconstruct tracks at the full collision rate (40 MHz) and provide them to the Level 1 (L1) trigger, to improve its event selection performance.

The Data Trigger and Control (DTC) cards interface read-out electronics inside the CMS tracker sensor modules to the rest of the experiment, such as the track finder, data acquisition (DAQ) and L1 trigger systems. All the connections are established through high-speed serial protocols over optical fibers.

The extent of the tasks assigned to the DTC's require these components to be highly reliable and, at the same time, highly performant. SPRACE is developing parts of the DTC firmware, contributing to the specifications for the card hardware and will financially contribute to the production of the cards.

Divulgação Científica / 65

Atividades de Outreach desenvolvidas pelo SPRACE

Author: Nelson Barrelo Jr.^{None}

Nessa palestra serão relatadas e discutidas as atividades de divulgação científica que vêm sendo promovidas pelo Centro de Pesquisa e Análise de São Paulo (SPRACE) ao longo desses dez anos. Serão também discutidas as perspectivas para o seu desenvolvimento e expansão futuros.

Análise de Dados / 66

Research activities of the SPRACE heavy ions group

Author: Sandra Padula¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista (BR)

Corresponding Author: sandra.padula@cern.ch

The research activities developed by the heavy ions group of the São Paulo Research and Analysis Center (SPRACE) during the recent years in high energy collisions will be reported and discussed.

Computação / 67

A próxima geração das redes da RNP

Author: Michael Stanton¹

¹ RNP

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que fornece desde 1992 conectividade nacional e internacional para a comunidade nacional de educação e pesquisa, está migrando para uma nova geração de rede nacional e conexões internacionais, para atender os desafios do crescimento de demanda dos seus usuários, que já esgota a geração anterior adotada em 2011. Novas abordagens importantes incluem a busca de capacidade escalável de infraestrutura de rede, tanto nacional como internacional, bem como a diversificação da conectividade internacional, reduzindo a latência da comunicação.

Computação / 68

Serviços para suporte à eCiência

Author: Leandro Ciuffo¹

¹ RNP

Será apresentado alguns dos serviços da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para o aumento do desempenho de transferências de grande volume de dados, bem como uma iniciativa para a modelagem de novos serviços para e-ciência.

Instrumentação / 69

ATLAS Liquid Argon Electromagnetic Calorimeter Upgrade Activities

Author: Marco Lisboa Leite¹

¹ Universidade de Sao Paulo (BR)

Corresponding Author: marco.leite@cern.ch

In about two years, the ATLAS experiment will enter a new phase of data taking (Phase-I) when a new luminosity regime will permit to accumulate more than 300 1/fb of data from pp collisions by the end of 2023. The electromagnetic calorimeter information is a key element for the Level-1 trigger and will require a complete redesign in order to cope with the increased pile-up. Moreover, in 2026 a new upgrade of the LHC complex will start the era of high luminosity (Fase-II) where more than 200 simultaneous collisions per bunch crossing will be a challenge for all subsystems performance, requiring new approaches to provide very fast timing information in order to preserve the performance in extreme phase spaces. In this talk, we will discuss some of the activities underway for Phase-I and the prospects for the Phase-II.

Instrumentação / 70

Use of small photomultiplier tube to extend dynamic range of Pierre Auger Observatory surface detector

Authors: Allan Machado Payeras¹; Anderson Campos Fauth¹

¹ UNICAMP

The surface detector of the Pierre Auger Observatory consists of 1660 water-Cherenkov detectors (WCD). When detecting extensive air showers with energy larger than 3×10^{19} eV is present a saturation for at least the detector closer to the shower core. In this work we present an analysis of the performance of the engineering array which consists of ten WCD with a fourth photomultiplier tube with a small photocathode area. We verified that during the analysis period the photomultiplier tubes presented a very robust and stable behaviour. The calibration of the small photomultiplier tubes was performed so that their signals can be converted from hardware units to a physical unit which reflects the particle density that crossed the station, such unit is the VEM (vertical equivalent muon) defined as the average charge registered in the standard photomultiplier tubes when a vertical central-going muon cross a station. A dependency of the calibration with long-term variations of temperature was discovered. Finally, we showed that the implementation of a small photomultiplier tube in a station extends its dynamic range by a factor of 25 times.

Instrumentação / 71

RPC Tower for the Upgrade of the Pierre Auger Observatory

Author: Luis Mendes¹

Co-authors: Aberto Blanco ²; Luis Lopes ²; Mario Pimenta ³; Miguel Ferreira ²; Otto Lippmann ⁴; Pedro Assis ³; Ricardo Luz ³; Ronald Shellard ⁴; Ugo Giaccari ⁴

¹ LIP/CBPF

² LIP

³ LIP/IST

⁴ CBPF

The Pierre Auger Observatory, located near the town of Malargue (Argentina), is the largest facility for studying cosmic rays above 10^{17} eV. One of the main achievements already established is the observation of the suppression in the energy spectrum around 4×10^{19} eV compatible with the GZK cutoff. However the measurement of the energy spectrum alone is not enough to clarify the origin of such a feature. Indeed the mass composition measurements suggest the possibility of a different mechanism to explain the suppression region, not due to a propagation effect of cosmic rays but to the maximum energy achievable in the astrophysical sources. To assess this complex astrophysical scenario, whose phenomenology is still far from being understood, the Pierre Auger Observatory has recently begun a dedicated program to update its detector capabilities. The upgrade proposal is based on improved mass composition determination using the water-Cherenkov detectors of the Observatory in combination with surface scintillator detectors on top of them.

In this contribution, we present the RPC (Resistive Plate Chamber) hodoscope developed at the CBPF (Rio de Janeiro) in collaboration with LIP (Lisboa) for testing/debugging the scintillator detectors of the Observatory. A prototype of the hodoscope has already been placed in Malargue and used for a preliminary tests. Different hodoscope configurations are under discussion for optimizing the test procedure.

Instrumentação / 72

The Deep Underground Neutrino Experiment: Photon Detection System and ARAPUCA

Author: Ettore Segreto¹

¹ UNICAMP

One of the most important experimental programs that will address some of the open questions in neutrino physics is the Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE). It will be the first mega-science project on the US soil, that actually involves more than 1000 physicists. It will allow to shed

light on the CP violation in the leptonic sector, on the mass hierarchy of neutrino masses and on the octant of θ_{23} . The DUNE foresees the realization of a neutrino beam and of a near detector, both located at Fermilab (USA) and of a gigantic far detector based on the technology of liquid argon time projection chambers that will be installed at the Sanford Underground Research Facility in South Dakota, 1300 km faraway. Moreover the huge active mass of the far detector will allow to develop a rich program of non accelerator physics that includes the search for proton decay, the detection of supernova neutrinos and of atmospheric neutrinos.

The photon detection system is a fundamental component of the far detector, which will be used for timing, triggering and to improve the energy resolution of the detector for low energy events. Its baseline design is based on a device totally conceived in Brazil, the ARAPUCA. Its operating principle is based on the combination of active silicon photon sensors with a passive collector. The latter allows to increase the effective detection efficiency of the active sensors by trapping the photons inside an highly reflective box.

The Brazilian effort in developing and designing the Photon Detection System of the DUNE experiment will be illustrated.

Instrumentação / 73

ESTIMAÇÃO DA ENERGIA DO CALORÍMETRO DE TELHAS DO ATLAS EM CONDIÇÕES SEVERAS DE EMPILHAMENTO DE SINAIS

Author: Bernardo Sotto-Maior Peralva¹

¹ *Federal University of Juiz de Fora (BR)*

Corresponding Author: bernardo.sotto-maior.peralva@cern.ch

O Calorímetro de Telhas (TileCal) é o principal calorímetro hadrônico do experimento ATLAS no LHC. Este sistema de calorimetria possui aproximadamente 10.000 canais de leitura que amostram a energia depositada pelas interações entre as partículas e o componente passivo do calorímetro. O sinal analógico produzido pela eletrônica de leitura é digitalizado numa taxa de 40 MHz e uma janela de sete amostras temporais são utilizadas para representar o sinal. A tarefa de estimação da energia se resume em estimar a amplitude do sinal digitalizado presente na janela de leitura. Entretanto, devido à operação em condições de alta luminosidade, os canais de leitura observam o efeito de empilhamento de sinais, que distorce o sinal. O método atualmente empregado pelo TileCal para a estimação da energia é o Filtro Ótimo (OF) e se baseia na soma ponderada entre as amostras temporais recebidas e os coeficientes do filtro. O procedimento de otimização assume um modelo determinístico para o sinal de interesse e utiliza a matriz de covariância do ruído eletrônico de cada canal para minimizar a contribuição do ruído na medida da amplitude do sinal. Entretanto, a obtenção de um modelo confiável para o empilhamento de sinais, com uma quantidade de parâmetros suficientemente pequena, permitindo sua estimação a partir das amostras, não é viável. Desta forma, para o cenário de alta luminosidade do LHC previsto para a Fase II, métodos alternativos estão sendo testados. Dentre tais métodos, o Filtro de Wiener, proposto pela colaboração ATLAS/Brazil, apresenta uma abordagem interessante uma vez que um modelo para a representação dos dados não é necessário. Esta apresentação visa apresentar e avaliar os métodos atualmente disponíveis para operação online e offline no TileCal em condições severas de empilhamento de sinais, no que tange a eficiência de estimação da energia e qualidade de reconstrução do sinal estimado. Conjuntos de dados de Monte Carlo foram utilizados para projetar e avaliar a eficiência dos métodos de estimação de energia em condições de alta luminosidade. Os resultados mostram que a eficiência da versão do Filtro de Wiener supera o método atualmente utilizado para estimação da energia nas células de alta ocupância do TileCal.

Computação / 74

HEP and Machine Learning Synergy - an overview of ML initiatives in the HEP field

Authors: José Cupertino Ruiz Vargas¹; Raphael Mendes de Oliveira Cóbe¹

¹ UNESP

The HEP agenda of exploring new physics beyond the standard model requires the identification of rare signals immerse in huge backgrounds. Substantially increased levels of pileup make this identification a great challenge. Neural Networks (NN) and Boosted Decision Trees (BDT) have been used in HEP for quite a long time, for instance in particle identification algorithms. The Deep Neural Networks (DNN) revolution has made significant impact on HEP and it is particularly promising when there is a large amount of data and features, as well as symmetries and complex nonlinear dependencies between inputs and outputs. Nowadays, there are a lot of R&D in this area, particularly in speeding up computationally intensive pieces of the workflows, enhancing physics reach by better classifying the events, improving data compression by learning and retaining only the most relevant ones, anomaly detection for detector and computing operations as well as simulation. In this talk we intend to give a brief overview on how Machine Learning is being used in the HEP field as well as show some initiatives being conducted by the SPRACE project.

Análise de Dados / 75

Measuring multi-strange hadron in heavy-ion collisions at the LHC with ALICE

Author: Danilo Silva De Albuquerque¹

¹ University of Campinas UNICAMP (BR)

Corresponding Author: danilo.physics@gmail.com

A strongly interacting state of matter known as the Quark-Gluon Plasma (QGP) is formed in the high temperature and energy density conditions reached in ultra-relativistic heavy-ion collisions. Historically, one of the signatures of the formation of such a system was the enhanced production of strange and multi-strange hadrons with respect to non-strange. The ALICE detector is ideally suited to study identified particle production rates. The excellent tracking and particle identification capabilities allow the reconstruction of multi-strange baryons (Ξ^- , Ξ^+ , Ω^- and Ω^+) via their weak decay channels over a large range in transverse momentum (p_T). In this work, we report on the p_T spectra and total yield of such hadrons at central rapidity in several centrality classes as measured by ALICE for Pb-Pb collisions at the energy of $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV and for Xe-Xe collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.44$ TeV. The yields are normalized by the corresponding measurement of pion production in the same centrality class in order to study the enhancement of multi-strange hadrons. Comparison of hyperon-to-pion ratio between different systems, such as pp, p-Pb, Xe-Xe and Pb-Pb collisions shows that production of multi-strange baryons relative to pions follows a continuously increasing trend from low multiplicity pp to central AA collisions.

Instrumentação / 76

Trigger de Muons Assistido pelo TileCal

Author: Augusto Santiago Cerqueira¹

¹ Federal University of Juiz de Fora (BR)

Corresponding Author: augusto.santiago.cerqueira@cern.ch

Durante os primeiros anos de operação do LHC (do inglês Large Hadron Collider), o trigger online de muons do experimento ATLAS operou com uma grande quantidade de ruído de fundo na sua região da tampa devido a prótons de baixo momento que emergiam dos magnetos toroidais e da blindagem

do feixe do LHC, diminuindo sua eficiência. Para reduzir a quantidade de falsos muons durante os runs 2 e 3 do LHC, foi proposta a utilização do sinal da camada mais externa do calorímetro hadrônico de telhas (TileCal) em coincidência com as câmaras de muons. Os estudos e o desenvolvimento do sistema TileMuon iniciaram-se ao final de 2013 e apontaram uma redução no ruído de fundo maior que 80% na região do barril estendido do TileCal, mantendo uma eficiência de detecção acima de 97%. Atualmente o TileMuon encontra-se no início da operação após o comissionamento realizado ao longo do ano passado. Este trabalho descreve sucintamente o sistema TileMuon e apresenta os resultados obtidos durante o comissionamento e início de sua operação no ATLAS.

Computação / 78

BR-SP-SPRACE WLCG Tier-2 Cluster

Authors: Jadir Silva^{None}; Marcio Costa^{None}

Instrumentação / 79

Status do experimento Modulation no CBPF

Author: Raphael Perci¹

Co-author: André Massafferri¹

¹ CBPF

Corresponding Author: massafferri@cbpf.br

O experimento Modulation é um experimento dedicado a medição estável de longo prazo das emissões gama resultantes de decaimentos β , com a capacidade de produzir dados com alta qualidade e precisão, possibilitando a identificação de possíveis influências sistemáticas. Diferentes isótopos radioativos são monitorados por trinta e dois detectores de NaI(Tl) em quatro configurações em diferentes países e continentes.

Instrumentação / 82

On the spectrum of antihydrogen: characterization of the 1S-2S transition

Author: Rodrigo Lage Sacramento^{None}

The study of the spectrum of atomic hydrogen has played a central role in the history of quantum mechanics. The comparison between theory and experiment has found in the hydrogen atom your best companion. As the simplest atomic system, it allowed the comparisons to reach an unprecedented accuracy. Examples of the power of comparison between theory and experiments is the capability of quantum electrodynamics to precisely predict transition frequencies, and modern measurements of the 1S-2S transition (in atomic hydrogen) to a precision of a few parts in 10¹⁵.

Over the past few years has been possible to study the antimatter equivalent of the hydrogen –the antihydrogen. The motivation behind the study of the antimatter is try to understand the unbalanced amount of matter and antimatter in our Universe. The Standard Model predicts that should have been equal amounts of matter and antimatter in the primordial Universe, but today ours Universe is observed to be made almost entirely of ordinary matter. This difference motivates the search of a small asymmetry in the laws of physics that govern the two types of matter. In this case, the CPT theorem requires that hydrogen and the antihydrogen spectrum should be exactly the same.

In this work the ALPHA collaboration reports the more precise measurement performed on anti-atom. Here we characterize one of the hyperfine components of this transition using magnetically trapped atoms of antihydrogen and compare it to model calculations for hydrogen in our apparatus. This measurement is consistent with charge-parity-time invariance at a relative precision of the first observation of 2×10^{-12} —two orders of magnitude more precise than the previous determination—corresponding to an absolute energy sensitivity of 2×10^{-20} GeV.

Instrumentação / 83

Filtragem Offline de Elétrons Baseada em um Ensemble de Redes Neurais Especialistas

Author: Carlos Eduardo Covas Costa^{None}

O gradativo aumento de luminosidade no LHC tem exigido métodos mais eficientes para a manutenção da capacidade de seleção online e offline. Nesse sentido, o ATLAS adotou o algoritmo NeuralRinger, que possibilitou aliviar a demanda por processamento durante a filtragem online a partir de 2017. Essa estratégia, dedicada à seleção de elétrons, emprega outra representação da informação de calorimetria, baseada em 100 anéis concêntricos de energia ao baricentro de energia que é aproximado, na filtragem online, pela célula mais energética. A tomada de decisão emprega uma assembleia de redes neurais específicas por regiões de energia e posição da partícula incidente na região de precisão do experimento, o que possibilita limitar o impacto da resposta do detector no perfil dos anéis.

Este trabalho avalia a atuação do NeuralRinger para a seleção offline de elétrons no experimento ATLAS. Desenvolvem-se aprimoramentos a fim de estender o método para atingir sua eficiência máxima nesse ambiente. A necessidade de explorar toda a informação discriminante proveniente do Sistema de Calorimetria e Detector Interno é atacada como um problema de fusão de dados. Nesse âmbito, são utilizadas, adicionalmente aos anéis, as representações tradicionais em grandezas físicas para o treinamento de redes especialistas que, posteriormente, alimentam, através dos neurônios da camada escondida, a entrada de outra rede neural responsável pela fusão da informação e tomada de decisão. É realizada a busca por um espaço latente mais discriminante a partir da representação dos anéis empregando pré-processamento estatístico via Análise de Componentes Independentes (ICA), conhecimento especialista por intermédio de um mapeamento não-linear com dois parâmetros otimizados por busca em grade (Ringer-Rp) e compactação não-linear cega via Stacked AutoEncoder. Como a estatística disponível para o ajuste dos modelos é extremamente volumosa, foi desenvolvida uma estratégia própria para reduzir o processamento necessário no desenvolvimento dos modelos avaliados enquanto mantendo as amostras relevantes para o ajuste.

Compararam-se as propostas de extensão do NeuralRinger com a referência em atuação no ambiente offline, baseada em verossimilhança nas grandezas tradicionais, através de amostras de provas obtidas pelo método T&P para o decaimento $Z \rightarrow ee$, e seu respectivo ruído de fundo, em colisões próton-próton ocorridas em 2016 e simulações equivalentes. Quando apenas aplicando a fusão via redes especialistas, observou-se uma redução na taxa de falsos elétrons de 2,54% para 1,13% em valor central e com incerteza de validação cruzada desprezível para ambos operando com a mesma taxa de detecção de elétrons em dados de simulação.

Instrumentação / 84

#Abstract em submissão

Author: Hélio Nogiva^{None}

Instrumentação / 85**Trigger de Muons Assistido pelo TileCal****Author:** Augusto Cerqueira^{None}

Durante os primeiros anos de operação do LHC (do inglês Large Hadron Collider), o trigger online de muons do experimento ATLAS operou com uma grande quantidade de ruído de fundo na sua região da tampa devido a prótons de baixo momento que emergiam dos magnetos toroidais e da blindagem do feixe do LHC, diminuindo sua eficiência. Para reduzir a quantidade de falsos muons durante os runs 2 e 3 do LHC, foi proposta a utilização do sinal da camada mais externa do calorímetro hadrônico de telhas (TileCal) em coincidência com as câmaras de muons. Os estudos e o desenvolvimento do sistema TileMuon iniciaram-se ao final de 2013 e apontaram uma redução no ruído de fundo maior que 80% na região do barril estendido do TileCal, mantendo uma eficiência de detecção acima de 97%. Atualmente o TileMuon encontra-se no início da operação após o comissionamento realizado ao longo do ano passado. Este trabalho descreve sucintamente o sistema TileMuon e apresenta os resultados obtidos durante o comissionamento e início de sua operação no ATLAS.

Divulgação Científica / 86**Divulgação científica para o grande público: concepção, planejamento e conteúdo do projeto Uniso Ciência****Author:** Guilherme Profeta¹¹ UNISO**Corresponding Author:** guilherme.profeta@prof.uniso.br

O Uniso Ciência é um projeto de divulgação científica da Universidade de Sorocaba, com foco em mídias offline e online, voltado tanto para o público regional (fase 1: Sorocaba e 17 cidades da região), como internacional (fase 2: instituições parceiras em todo o mundo), compreendendo um tablôide trimestral, uma revista bilíngue semestral e um portal online. O projeto nasceu de uma percepção recorrente no meio acadêmico: programas de pós-graduação detêm conhecimento especializado, com aplicabilidades diretas e indiretas à vida cotidiana das comunidades, contudo estão disponíveis apenas a uma pequena parcela da população, versada em jargões específicos e suficientemente creditada para frequentar ambientes acadêmicos restritos. O Uniso Ciência tem como objetivo contribuir para mudar essa percepção de que a pesquisa acadêmica é hermética, desassociada da vida real da comunidade. Para atingir esse objetivo, publica reportagens jornalísticas baseadas em dissertações e teses dos programas de pós-graduação da Uniso: Educação (Mestrado e Doutorado), Comunicação e Cultura (Mestrado), Ciências Farmacêuticas (Mestrado e Doutorado) e Processos Tecnológicos e Ambientais (Mestrado Profissional), além de reportagens especiais produzidas com participação discente sobre as atividades brasileiras no Cern. Esta apresentação cobrirá todo o processo de operacionalização do projeto: 1) concepção, 2) planejamento, 3) conteúdo, de modo a funcionar como um estudo de caso, apresentando as práticas que se mostraram bem sucedidas a partir da experiência da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade de Sorocaba. Cópias dos produtos serão distribuídas aos participantes.

87

Plenária Análise de Dados**Corresponding Author:** jun@ifl.unicamp.br

88

Plenária Instrumentação

Author: José Seixas^{None}

89

Plenária Computação

Author: Rogério Iope^{None}

90

Plenária Divulgação Científica

Author: Marcia Begalli^{None}